

吳鞠通先生醫案

吳鞠通先生醫案 卷二

目錄

中風

癰癤

肝風

肝厥

脇痛

肝癰

癲狂

虛勞

吐血

衄血

便血

腫脹

單腹脹

腹脹

滯下

積聚

淋濁

泄瀉

吳氏醫案卷二

後學 高德僧汝
裴吉生慶元校刊

中風

陶氏

六十歲

左肢拘攣舌厚而蹇不能言上有白苔滴水不能下咽飲水則噎

此中風挾痰之實症前醫誤與膩藥補陰故隧道俱塞先與開肺

生石膏

四兩

杏仁

四錢

鮮桑枝

五錢

雲苓塊

五錢

防己

五錢

白通草

一錢

五分

姜半夏

五錢

廣皮

三錢

煮三杯分三次服

服一帖而飲下咽服七

帖而舌腫消服一十帖諸病雖漸減而無大效左肢拘攣如故舌腫雖消

而語言不清脈兼結余曰此絡中有塊痰堵壅皆誤補致壅之故非針不

可於是延郝七兄針之針法本高於舌上中泉穴一針出紫黑血半茶杯

隨後有物如蚯蚓令伊子以手探之即從針孔中拉出膠痰一條如勻粉

長七八寸左手支溝穴一針透關左手背三陽之絡用小針針十餘針以後用藥日日見效前方止減石膏之半服至七十餘帖而能策杖行矣服九十帖能自行出堂上輻矣諸症悉除

哈六十六歲

中風溼口歪臂不舉腿腫脈洪數口渴胃不開與辛涼開水道法

石膏

生四兩

茯苓皮

一兩

桂枝

三錢

滑石

飛一兩

晚蠶砂

三錢

防己

二錢

半夏

五錢

白通草

二錢

桑枝

五錢

煮三杯分三次服

二帖而效十四帖

全愈後以補脾胃收全功

葉氏

三十歲

中風神呆不語前能語時自云頭暈左肢麻口大歪不食六脈弦

數此症中也與柔肝法

直生地

八錢

白芍

生三錢

左牡蠣

五錢

生鱉甲

五錢

麥冬

二錢

炙甘草

三錢

煮三杯分三次服

一帖而神有清意人與之言能點頭也又於前方

加生阿膠三錢丹皮四錢三帖而半語七帖而大愈能食十二三帖而如

故

李氏七十伏暑夾痰飲肝鬱又加中風頭痛舌厚白苔言蹇畏寒脈洪數而弦

先與辛涼清之

連翹三錢 苦桔梗三錢 桑葉三錢 銀花三錢 茶菊花三錢 甘草一錢 薄荷

一錢五分 刺疾煎二錢 煮三杯分三次服四帖

又頭痛畏寒舌厚漸消苔不退茲以通宣三焦兼開肝鬱

飛滑石六錢 半夏四錢 白蔻仁二錢 雲茯苓連皮五錢 薏仁五錢 廣鬱金

二錢 杏仁泥五錢 香附二錢 白通草一錢 煮三杯分三次服服二十餘帖而大安一切

復元

痲癰

己卯七月 某氏其人本有肝風頭痛病根少陽鬱勃真水不能上濟可知又現

伏暑內發新涼外加金來尅木木愈病矣少陽所致為痲癰理固然也勉

與清膽絡兼清心包

犀角 三錢 羚羊角 三錢 茶菊花 三錢 丹皮 五錢 細生地 五錢 鈎藤鈎 二錢

桑葉 三錢 苦桔梗 二錢 鮮荷葉 去蒂一枚 甘草 一錢五分 煮三杯分三次

服 間服紫雪丹一二錢

又

此症肝風無疑昨服柔肝清熱之劑而燒退是外邪已解現在六脈弦細手足發涼似有厥意治法熄風之中似宜添入開心胞之絡為是倘一二天不醒便難挽回矣

細生地 五錢 沙參 二錢 生牡蠣 三錢 羚羊角 三錢 丹皮 五錢 刺蒺藜 二錢

生鱉甲 三錢 阿膠 二錢 石菖蒲 一錢 茶菊花 三錢 甘草 一錢 嫩桑枝 廿寸

煮三杯分三次服 間服紫雪丹牛黃丸

又

用玉女煎加犀角丹皮

又

用玉女煎加犀角丹皮連翹銀花重用石膏知母

又少陽頭痛甚急外因亦未盡解

生石膏一兩連翹連心三錢茶菊花三錢細生地五錢銀花三錢冬桑葉

三錢左牡蠣五錢麥冬不去心五錢鈎藤鈎二錢羚羊角三錢丹皮五錢

生甘草二錢炒知母二錢天冬二錢煮三杯分三次服間服紫雪丹三

分

肝風

癸亥正月廿八日章氏七十老年上虛下盛又當厥陰司天之年厥陰主令之候以故

少陽風動頭偏右痛目係引急最有壞眼之慮刻下且與清上

羚羊角三錢連翹一錢刺蒺藜二錢茶菊花二錢桑葉二錢生甘草八分

苦桔梗一錢五分薄荷八分煮二杯分二次服日二帖服二日

三十日少陽頭痛已止現在胸痞脇脹肝胃不和肢痛腰痛譫兩和肝胃之中兼

與宣行經絡

桂枝尖二錢 半夏五錢 製香附二錢 杏仁泥三錢 廣皮一錢五分 生薑汁

三匙 廣鬱金二錢 青皮一錢 煮三杯分三次服二帖

二月初二日 因食冷物晝寐中焦停滯腹不和泄瀉與開太陽闔陽明法

桂枝五錢 茯苓塊五錢 肉果煨一錢五分 半夏三錢 生茅朮三錢 炮姜一

錢五分 猪苓三錢 藿香梗三錢 廣皮一錢五分 澤瀉三錢 廣木香一錢五

分 頭煎兩茶杯二煎一茶杯分三次服

初四日 諸症向安惟餘晨泄左手脈緊宜補腎陽

茯苓塊五錢 補骨脂三錢 蓮子連皮五錢 生於朮三錢 煨肉果三錢 芡實

三錢 兔絲子二錢 五味子一錢 水五碗煮成兩碗分二次服渣再煮一碗

明早服

初七日 卽於前方內去兔絲子加牡蠣粉三錢

初十日 太陽微風以桂枝法小和之

桂枝二錢 茯苓塊三錢 生薑二片 半夏三錢 炒白芍二錢 大棗去核一枚

廣皮二錢 炙甘草八分 煮二杯分二次服

日十一 右目澀小酉刻後眼前如有黑霧議鬆肝絡熄肝風益肝陰法

何首烏三錢 沙參三錢 菊菊花一錢五分 沙揆燕二錢 桔梗一錢五分 生

甘草八分 青箱子二錢 煮二杯分二次服 三帖後了然如故

癸酉二月十五日 陶氏 右脈洪大尺部更甚左脈弦細上盛下虛卒中不能言如中

風狀乃肝風內動絡熱竅閉之故證勢甚重

羚羊角一錢 沙參一錢五分 茶菊花一錢五分 苦桔梗一錢 麥冬二錢 刺

蒺藜一錢 生鱉甲三錢 桑葉一錢 生甘草八分 細生地一錢五分 煮二杯

分二次服 日二帖 服三月

日二十 上盛下虛竅閉不能言用輕清合芳香開上今稍能言但虛煩不眠心悸

頭暈仍係厥陰未熄茲用補心肝之體兼實下法

大生地 五錢 沙參 三錢 茯苓塊 三錢 炒白芍 六錢 麥冬 五錢 不去心 炒杏仁 三錢

錢 生龍板 四錢 阿膠 二錢 炙甘草 三錢 整硃砂 綿裹五錢 蓮子 連皮心 水 五錢

五杯煮取兩杯分二次服渣再煮一杯服

黃三十歲 肝風內動脈弦數乃真水不配相火水不生木故木強而直上行頭暈

甚即巋厥也久不治為癰中醫云痰者妄也先與清肅少陽膽絡繼以填

補真陰可也 此症最易錯看貽害不小

羚羊角 三錢 桑葉 三錢 苦桔梗 二錢 黑芝脉 研細 丹皮 二錢 鈎藤鈎 二錢

茶菊花 三錢 薄荷 七分 生甘草 一錢 煮三杯分三次服

丸方 定風珠

肝厥

乙丑十一月十一日 高氏 四十歲 肝陽上竄因怒即發十餘年矣經云久病在絡豈經藥可

效再肝厥之證亦有寒熱之不同此證脈沈而弦細其為寒也無疑大凡

寒厥必死今不死者以其爲胸厥而非臟厥也現脇下有塊有聲經色紫

黑議先用溫通絡脈法

新絳紗 三錢 半夏 五錢 降香末 三錢 川椒 炒黑 二錢 旋覆花 包 三錢 生香

附 三錢 桂枝尖 嫩 三錢 歸鬚 二錢 桃仁炭 三錢 煮 二杯 分 二次服 三帖

額氏 二十歲 除夕日亥時先是產後受寒痺痛醫用桂附等極燥之品服之大

效醫見其效也以爲此人非此不可用之一年有餘不知溫燥與溫養不同可以治病不可以養生以致少陰津液被劫無餘厥陰頭痛單顙頂一點痛不可忍畏明至於窗間有豆大微光卽大叫必窒如漆黑而後少安一日厥去四五次脈弦細數按之無力危急已極勉與定風珠潛陽育陰以熄肝風

大生地 八錢 麻仁 四錢 生白芍 四錢 生龜版 六錢 麥冬 不去心 四錢 生阿

膠 四錢 生鱉甲 六錢 海參 二條 生牡蠣 六錢 雞子黃 去渣後化入攪勻

二枚甘草炙五錢

煮成八杯去渣上火煎成四杯不時頻服

正月初一日

微見小效加

鮑魚片

一兩

煮成十杯去渣煎至五杯服如前

初二日

又見效方法如前

初三日

厥止頭痛大減猶畏明方法如前

初四日

腰以上發熱腰以下冰涼上下渾如兩截身左半有汗身右半無汗左右

渾如兩畔自古方書未見是症竊思古人云琴瑟不調必改絃而更張之

此症當令其復厥厥後再安則愈 照前方定風珠減半加 青蒿 八

分當夜卽厥二三次

初五日

照前定風珠原方分量一帖服後厥止神安

初七日

仍照前方

初八日

方皆如前漸不畏明至正月二十日外徹去帳幔湯藥服至二月春分後

與專翕大生膏一料全愈

甲申十一月初二日楊女九歲

初因肝鬱脇痛繼而肝厥犯胃醫者不識病名肝着與

絡病治法無非滋陰補虛或用涼藥以致十年之久不能吃飯飲粥湯止
一口食炒米粉止一酒杯稍聞聲響即瘕厥終夜抽搐二三日方漸平六
脈弦緊而長經閉二年周身疼痛痰飲咳嗽終年無已時骨瘦如柴奄奄
一息此症內犯陽明故不食木克脾土故飲聚陽明空虛故無主聞聲而
驚外犯太陽故身痛而瘕本臟自病故厥經謂治病必求其本仍從肝絡
論治

新釋紗 旋覆花包 降香末 廣鬱金 歸橫鬚 川椒炭 蘇子霜

桂枝 半夏 青皮

十四日

服前方七帖脇痛雖輕痰飲特甚咳嗽頻仍夜卧不安暫停絡藥專與

和胃蠲飲

半夏八錢 生薏仁五錢 枳實二錢 茯苓六錢 淡乾姜三錢 廣皮四錢 桂枝

三錢 煮三杯分三次服

廿七日 胃口稍開能食稀粥半碗脇仍痛仍服前活絡方內去川椒炭加麝皮

初四日 脇痛平咳嗽未除再服前蠲飲方

十一日 因余有由淮上赴紹興之行令其常服和胃方脇痛發時暫服新絳旋覆

花湯此時已能吃爛飯半碗矣

乙酉二月 脈稍和平雖弦而有胃氣乾飯能吃一碗有半經亦復通仍間服前

二方

三月初九日 夜間偶感燥氣症欲起不得起欲坐不得坐欲卧不得卧煩躁無奈不

可當約二時服霹靂散三兩許始安

次日仍與和胃

十八日 能食乾飯兩小碗矣六脈又和一等仍間服前二方

四月初三日 余復由淮至紹初八日至蘇州不放心此病作書一封令其調適性情

五月間又作書一封痛以大道理開導之十月間始得回書據云竟以余書作座右銘每日諷誦一過飲食又進精神大長閤家歡樂

肝痛

伊氏二十歲肝鬱脇痛病名肝着亦婦科之常症無足怪者奈醫者不識見其有

寒熱也誤以爲風寒而用風藥夫肝主風同氣相求以風從風致風鳴張肝主筋致令一身筋脹肝開竅於目致令晝夜目不合不得卧者七八日肝主疏泄肝病則有升無降失其疏泄之職故不大便小溲僅通而短赤特甚醫者又不識誤以爲腸胃之病而以大黃通之麻仁潤之致令不食不餓不便不寐六脈洪大無倫身熱且坐不得卧時時欲嘔煩躁欲怒是兩犯逆也金匱謂一逆尚引日再逆促命期不待智者而知其難愈也議宜通絡脈法肝藏血絡主血故也必加苦寒泄熱脈沉洪有力且膽居肝內肝病膽即相隨故也

新絳紗 四錢 蘇子 研四錢 歸橫鬚 四錢 桃仁 四錢 旋覆花 包五錢 降香末

四錢 川棟皮 五錢 雲連 炒二錢 廣鬱金 三錢 急流水八碗煮成三碗晝夜

六次服

又服前方見小效即於前方內減川棟皮二錢加

丹皮 炒黑 三錢 生香附 二錢

又脇痛減去大半但不得寐時時欲嘔議兩和陽明厥陰仍兼宣絡

半夏 醋炒五錢 降香末 三錢 黃芩 二錢 新絳 三錢 蘇子霜 二錢 青皮 一錢

五分 桃仁 三錢 川棟子 二錢 秫米 一撮 歸鬚 三錢 廣鬱金 一錢 煮二碗分

日二夜一三次服

又昨方業已效今日再複苦藥即苦與辛合能降能通之義即於前方內加

古勇連 姜汁 二錢

又昨用苦辛法脈減使通今日腹覺痛將近經期一以宣絡為主

新絳紗 包五錢 丹皮 炒三錢 元胡索 一錢 旋覆花 包三錢 歸鬚 三錢 製香
附二錢 降香末 三錢 鬱金 二錢 兩頭尖 一錢 桃仁泥 三錢 條芩 酒炒一錢
五分 蘇子霜 二錢 水八杯煮取三杯分日二夜二三服

又 昨日一味通絡已得大便通利腹中痛止但不成寐今日用胃不和則卧
不安飲以半夏湯覆杯則寐法仍兼宣絡此仲景先師所謂衝脈累及陽
明先治衝脈後治陽明法也

新絳紗 四錢 半夏 一兩 降香末 二錢 旋覆花 包五錢 秫米 二兩 水十杯煮
成四杯日三夜一分四次服

又 昨與半夏湯和胃藥已得寐但脈沉數漫赤短議加苦藥泄肝熱而通小
腸火府

新絳紗 四錢 黃柏 鹽水炒 生香附 三錢 旋覆花 包五錢 半夏 六錢 炒雲連
二錢 降香末 三錢 秫米 一兩 煎法如前

又

昨日和胃宣絡兼用普通火府今日得寐澀色稍淡口亦知味是陽明已有漸和之機矣惟胸中微痛背亦掣痛按肝脈絡胸背則太陽經也是由厥陰而累及少陽肝膽為夫妻也由少陽而累及太陽少太為弟兄也今日仍用前法加通太陽絡法

新絳紗

三錢

黃柏

鹽水炒一錢五分

桂枝嫩尖

三錢

旋覆花

包三錢

半夏

五錢

棟子皮

二錢

降香末

三錢

秫米

六錢

古勇黃連

一錢

生香附

三錢

煎法如

前

前

又

繞臍痛瘕也亦循脈肝經之病

桂枝尖

三錢

雲連

炒黑一錢

淡吳萸

炒黑三錢

新絳紗

三錢

半夏

五錢

生香

附三錢

全當歸

炒三錢

秫米

八錢

小茴香

炒黑三錢

川棟子

三錢

煎法如前

兩和肝胃兼治瘕痛

又

又

兩和肝胃兼治瘕痛

淡吳萸

炒黑二錢

半夏

八錢

全當歸

三錢

新絳紗

二錢

烏藥

三錢

生香附

三錢

錢旋覆花包三錢青皮二錢小茴香炒黑三錢降香末三錢雲連炒黑一錢五分淡乾
姜二錢桂枝尖三錢秫米一兩煮成四杯日三夜一分四次服

又腹中拘急而痛小便短赤皆陰絡阻塞濁陰凝聚之象與宣通陰絡降濁
法

桂枝尖三錢歸鬚三錢小茴香炒三錢降香末三錢吳英一錢五分桃仁泥炒
二錢川棟子三錢琥珀研細冲三分元胡索二錢新絳紗三錢麝香研細冲兩
頭尖二錢水六杯煮成二杯每服半杯冲韭白汁兩小茶匙日二夜一明
早一分四次服

又仍用前法但昨日未用半夏今徹夜不寐酉刻再服素問半夏湯一帖
又因肝病不得疏泄兼有痺痛議兩疏氣血法

桂枝尖三錢新絳紗三錢歸鬚三錢川棟子三錢小茴香炒黑三錢防己二錢
降香末三錢晚鱸砂三錢牛膝二錢桃仁泥三錢古勇連吳英汁炒一錢

不用連即連也煮三杯分三次服

又諸症悉滅而未盡除左脈已和右脈弦大是土中有木於疏氣血之中兼泄木安土法

桂枝尖三錢半夏五錢新絳紗三錢川棟子三錢白芍酒炒三錢小茴香炒

三錢降香末三錢防己二錢歸橫鬚三錢茯苓皮三錢青皮二錢廣鬱金

二錢杏仁泥三錢牛膝二錢晚蠶砂三錢煮三杯分三次服

又右脈弦剛土中木盛

姜半夏六錢白芍酒炒六錢新絳紗三錢桂枝尖四錢歸鬚三錢川棟子三錢

茯苓塊四錢鬱金二錢小茴香三錢降香末三錢廣皮二錢煎法如前

又脈沉數頭痛時微時盛向來時發時止已非一日此乃少陽絡病虛風內

動也今日且與清膽絡法勿犯中焦

苦桔梗一錢白芍焦一錢甘菊花炒二錢羚羊角八分丹皮一錢五分刺蒺

藥一錢 鈎藤鈎一錢 桑葉二錢 生甘草八分 共爲粗末分三次服

又 治下焦絡法

整當歸五錢 酒洗白芍六錢 生香附三錢 新絳紗二錢 澤蘭一錢 廣鬱金三錢

桂枝尖二錢 砂仁二錢 研細小茴香三錢 煮成三杯日二晚一分三次服

又 八脈麗於肝腎肝病久未有不累及八脈者用通補陰絡兼走八脈法

桂枝尖一錢 歸身三錢 小茴香二錢 杭白芍六錢 杞子炒二錢 桂圓肉二錢

新絳紗一錢五分 砂仁一錢五分 煮三杯分次服

又 法全前

桂枝尖一錢 炒白芍六錢 生香附三錢 降香末三錢 澤蘭一錢 廣木香一錢

新絳紗三錢 川芎八分 桂圓肉二錢 全當歸三錢 煮三杯分三次服

尹氏三十歲誤服大辛大溫致傷心陽使下焦濁陰來攻過提致少陽無忌有升

無降上愈盛而下愈虛且與鎮固法非治病也特醫藥耳

新絳紗 三錢 姜半夏 六錢 焦白芍 三錢 旋覆花 包三錢 炙龜版 五錢 黑梔
子 三錢 代赭石 煨一兩 降香末 三錢 古勇連 一錢 紫石英 研細一兩 煮成三大
茶杯分三次服渣再煮一杯服

又
鎮衝脈泄膽陽業已得效仍宗其法其血絡之鬱痛未能純治蓋事有緩
急也

紫石英 一兩 新絳紗 三錢 焦白芍 五錢 代赭石 一兩 旋覆花 包四錢 炒梔
子 三錢 炙龜版 八錢 姜半夏 六錢 古勇連 一錢 煮成三大茶杯分三次服
渣再煮一杯服

癸亥十一日 蘇氏二歲 脈弦數左尺獨大癰居右脇發則攻心痛躍不止病名肝
疳先宜宣絡後補八服

新絳紗 三錢 桃仁 炒三錢 炒丹皮 三錢 旋覆花 包三錢 鬱金 一錢 元胡索
一錢 降香末 三錢 歸鬚 一錢 兩頭尖 揀淨三錢 煮三杯分三次服

十二月初一日肝着通絡法業已見效仍宗前法但必須用化癥回生丹間服為妙

取其治病不傷正耳

新絳紗三錢 半夏三錢 生香附三錢 旋覆花包三錢 桃仁三錢 蘇子霜三錢

降香末三錢 烏藥二錢 元胡索二錢 廣鬱金二錢 歸鬚二錢 煮三杯分

三次服二帖

初三日於前方內加兩頭尖三錢 丹皮炒黑五錢 白芍炒三錢 韭白汁三小匙

初六日藥力不及且用進法

新絳紗三錢 生香附三錢 桃仁泥三錢 旋覆花包三錢 歸鬚一錢五分 焦

白芍六錢 川棟子三錢 丹皮五錢 藏紅花二錢 煮三杯分三次服三帖

十四日新絳紗三錢 桃仁五錢 黑梔子五錢 旋覆花包三錢 香附生三錢 蘇子霜

三錢 降香末三錢 鬱金二錢 元胡索三錢 川棟子三錢 歸鬚一錢五分 藏

紅花三錢

煮三杯分三次服

十六日業已見效照前方日服半帖丸藥減三分之二

甲子正月經來五日顏色已正不得過行傷正其寂氣留爲丸藥緩化可也茲

議寧心止汗

白芍炒六錢 直熟地五錢 牡蠣五錢 茯苓五錢 炙龜版八錢 丹皮三錢 麥

冬不去心 五味子製一錢 小麥洗淨後入 洋參一錢 整豆砂大紅紗包 大

棗去核二枚 水八碗煮取八分三碗分三次服三帖

戊子二月十四日 繼脈弦緊肝鬱瘀血作燒兼之痰飲喘欬不得卧不能進食當臍疝

痛爲日已久勢甚危急勉與逐痰開胃兼之化痰止熱

新絳紗三錢 良姜二錢 桃仁泥三錢 旋覆花包三錢 青皮二錢 小枳實三

錢 姜半夏六錢 歸鬚二錢 蘇子霜三錢 降香末三錢 廣皮三錢 川椒炭三

錢 煮三杯分三次服二帖 此方下有案未全

庚寅六月廿九日 恒婦十九歲 肝鬱兼受燥金脇痛二三年之久與血相搏發時痛不可

忍嘔吐不食行經不能按月色黑且少漸至經止不行少腹痛脹湯藥先

宣肝絡兼之和胃再以九藥緩通陰絡

新絳紗三錢 桃仁三錢 川椒炭三錢 旋覆花包三錢 歸鬚三錢 蘇子霜三

錢 姜半夏五錢 青皮二錢 廣橘皮三錢 降香末三錢 生薑五錢 煮三杯分

三次服 十四帖 外以化癥回生丹每日清晨服一錢開水調服

七月十四日 諸症俱減照原方再服七帖分十四日服每日仍服化癥回生丹一錢

廿八日 痛止脹除飲食大進惟經仍未行六脈弦細右更短緊與建中合二陳湯

以復其陽

姜半夏四錢 桂枝四錢 生薑三大片 廣橘皮三錢 白芍炒二錢 大棗去核

二枚 炙甘草三錢 膠飴一兩去渣 後化入 煮二杯分二次服每日服化癥回生丹

一錢

八月十服前方十數帖兼服化癥回生丹十數丸一切俱佳經亦大行

肝癰

辛巳三月廿四日謝四歲病起肝鬱脇痛痰中帶血病名肝着醫者不識絡病因由

與絡病治法非見血投涼即見血補陰無怪乎愈治愈窮也大凡血症之脈左脈堅搏治在下焦血分右脈堅搏治在上焦氣分茲左手脈浮取弦沉取洪大而數重按即芤前曾痰有氣味現在痰夾瘀滯黑色唇舌眇白其爲肝經絡瘀夾痰飲咳血無疑勢已憊極勉與宣絡止血兼之兩和肝胃以逐痰定咳

新絳紗三錢 桃仁三錢 廣鬱金二錢 庭覆花包三錢 半夏三錢 蘇子霜一錢

降香末一錢 歸鬚一錢 廣皮炭二錢 煮兩茶杯分四次服二帖

四月初二日血家左手脈堅搏治在下焦血分此症先因肝絡瘀滯以致血不歸經

日久不治由陰經損及陽氣自汗潮變痿弱陽虛也身熱左脈洪數而芤

漢傷也如是陰陽兩傷之極而瘀滯仍然未淨通絡則虛急補虛又絡滯兩難措手不得已日用新絳一方緩通其絡其補藥則用陰陽兩攝法聊盡人力而已

遼參一錢 沙蒺藜三錢 牡蠣六錢 茯神五錢 枸杞子三錢 龜版五錢 麥冬
不心四 五味子一錢 海參二條 煮三杯分三次服

初四日

病起於脇痛瘀血誤補致塞久嗽成勞至骨痠不能起床仍有瘀滯不化之形且痰有臭味即係肝着成癰前日脈雖大而濇昨日大見瘀血後今日則純然芤矣豈非瘀血之明徵乎若一味貪補斷難再起兼之宣絡萬一得點妄誕之論高明酌之○又新絳覆花湯與前補劑間服

新絳紗二錢 桃仁泥三錢 歸橫鱗八分 旋覆花包二錢 丹皮炭五錢 廣皮
炭一錢 製半夏一錢五分 煮二杯分三次服

此方金匱載在婦人虛勞門有識者其悟之上半日服此方完下半日服

前補方

初五日 痰中臭味太甚黑痰未淨是活絡之方不能除脈孔自汗甚足補攝之方

又不可緩痰稀唇白內有支飲於補方中去牡蠣海參鹽味之碍飲者此症極虛極實時人但知其虛而不知其實所以日誤一日以至于此治實

碍虛治虛碍實焉望成功○一通一補俱每日照前服法未改

初七日 脈較前斂戢於新絳方內半夏加一錢五分成三錢餘仍舊服法亦如之

初八日 今日左尺脈獨大加封固腎氣法餘有原案二方每日間服如前

灸龜版 八錢 人參 一錢 沙蔞藜 二錢 左牡蠣 六錢 麥冬 三錢 五味子 製
一錢 眞雲苓 五錢 杞子 炒黑三錢 炙甘草 三錢 焦白芍 三錢 蓮子 五錢 煮

二杯分二次服

初十日 於前方內加人參五分成一錢五分又加海參一條淡薤料三錢餘悉如

前四帖

十三日 仍照前每日間服一通一補方

十七日 左脈空大未飲精神較前雖好猶宜收攝下焦於前補方內去龜板五味

子白芍海參薤餘如舊間服法煮好去渣再上火煎成二杯分二次服

同日 痰色猶不能清白氣味亦不淨仍須宣絡

新絳紗 三錢 姜半夏 五錢 歸橫鬚 一錢 旋覆花 包二錢 廣鬱金 一錢 廣皮 五分

炭 一錢 煮二杯分二次服上半日服此方 四帖

廿一日 脈少飲通補二方間服如前 四帖

廿四日 痰濁未變脈象少飲午後微熱不寐飲食中漸而加不可太過不及

人參 一錢 左牡蠣 二錢 連子 五錢 連皮心 五錢 雲苓 五錢 枸杞子 三錢 炒黑 二錢 麥 五錢

冬 五錢 不去心 炒棗仁 三錢 炙甘草 五錢 海參 洗二小條 煮三杯分三次服 和

絳方仍如 前服七帖

五月初 身熱不寐已愈脈象大為斂戢面色亦佳惟濁痰未淨耳仍用二方間

服後方以逐末盡之癰膿而宣肝絡卽所以開肝絡鬱也

人參一錢五分 左牡蠣五錢 疾藜三錢 麥冬三錢 不去心 枸杞子錢 炒黑三錢 海參條二

雲苓五錢 炒棗仁三錢 淡菜大二錢 蓮子五錢 蓮心皮 五味子熟一錢 炙甘草

三錢 煮一杯分二次服午後服此

又方新絳紗二錢 香附二錢 桃仁泥二錢 旋覆花包二錢 歸鬚二錢 廣鬱金二

錢 姜半夏三錢 廣皮八分 煮兩小茶杯午前服

初八日覆診於補方內去牡蠣五味子餘仍舊一方間服如前

十三日痰已漸清肝亦漸平精神漸旺議去搜逐而補中與外並扶養飲意專用

人參二錢 雲苓塊六錢 香附三錢 於朮五錢 生薏仁五錢 廣皮三錢 半夏

五錢 小枳實一錢 炙甘草三錢 麥冬三錢 不去心 煮三杯分三次服 四帖

十七日覆診於前方內去麥冬加白蒺藜仁研一錢以腹微不和也

廿一日大便頻而不爽氣滯而有溼也

雲苔塊 六錢 遼參 一錢 姜半夏 三錢 生苡仁 五錢 於朮 焦三錢 廣皮炭 二

錢 白蔻 一錢 研淨杏仁 三錢 白通草 一錢 煮三杯分三次服 四帖

孫氏 三十歲 喘咳膿血氣臭午後身熱面赤宛若陰虛但左脇痛甚膿血之中兼

有稀痰乃肝癰夾痰飲所致先治肝癰與活肝絡

新絳紗 半夏 歸鬚 旋覆花 包 廣皮 鬱金 降香

末 桃仁 蘇子 元胡索 人參 後方加入青皮 煮 杯分

次服

服六七帖膿血由漸而少熱退脇痛大減於前方加人參又服四五帖後
以補脾胃逐痰飲收功

癲狂

陀 五十歲 病由情志而傷中年下焦精氣不固上年露罪中之萌近因情志重傷

又屆相火主令君火司天君火客氣內與本身君相火相應以致肝風騷

吳氏醫案

肝癰 癲狂

圭

張初起如狂醫者仍然攻風劫痰大用辛溫剛燥復以苦寒直下足助賊
為虐也現在左脈實大堅牢大非佳兆勉以紫雪丹定瘧肢厥而泄有
餘之客熱再以定風珠濟不足之真陰而熄內風之震動如果病有回機
神色稍清再議後法

紫雪丹

二兩每服二錢二時一服以神清為度牙關

緊閉用烏梅醃醋擦牙根其牙即開

大生地一兩

八錢

麥冬

不去心

生白芍一兩

真阿膠

四錢

麻仁

四錢

生鱉甲

一兩

炙甘草

草六錢

蚌水

生開沖入

雞子黃二枚

藥煮成去渣後和

入上火一二沸

煮成二碗

渣再煮

兩碗共五碗四刻服半碗盡劑再作服

二十日

左脈仍然牢固較昨日諸症俱減舌苔黃黑尺膚熱陽明絡現昨謂不止

本身虛熱且有客氣加臨非虛語也湯藥仍照前方再以清宮湯化牛黃

丸紫雪丹輩二時一次

連翹心

二錢

連心麥冬

五錢

元參心

五錢

竹葉捲心

三錢

蓮子心

一錢

五分

一大碗 服牛黃丸紫雪丹時卽以此湯化服待湯已涼

廿一 痲瘋肢厥雖止其狂如故會厭不利脈仍牢固數大按陽竝於上則狂的

係陽火有餘非極苦之藥直折其上蓋之威其勢未必得減况小腸火腑

非苦不通火降痰亦因之而降其會厭庶可得利矣

洋蘆薈 三錢 犀角 八錢 元參 五錢 龍膽草 三錢 麥冬 八錢 知母 六錢 真

雅連 三錢 丹皮 八錢 白芍 六錢 細生地 六錢

頭煎三碗今日服二煎兩碗明早服二帖半

廿四 脈氣大減但陽升阻絡機竅不靈議兼清會厭膽絡之熱

羚羊角 三錢 麥冬 三錢 洋蘆薈 一錢 直生地 三錢 知母 三錢 龍膽草 一

五錢 鉤藤 二錢 連翹 一錢 冬桑葉 一錢 煮成三杯 外米醋盃半每藥一

茶杯沖入半酒杯今晚一帖明早一帖

廿五 於前方內加 石膏 二兩

廿六 稍進糜粥覺勇力倍常舌紅黑脈較昨日實大猶為陽火有餘

犀角 六錢 細生地 四錢 雅連 四錢 麥冬 五錢 洋薤菖 四錢 丹皮 五錢 知

母 五錢 龍膽草 三錢 米醋 每藥一杯 濃煎三杯分三次服渣再煮一杯明

早服

廿七 於前方內加鐵落煎湯代水

鐵落即鐵舖中打鐵時所落鐵皮片

初二 諸證與脈皆減然未能淨苦藥猶不能減也煩腫係客氣議加辛涼

犀角 五錢 洋薤菖 三錢 雅連 三錢 麥冬 六錢 龍膽草 三錢 知母 四錢 連

翹 三錢 羚羊角 三錢 丹皮 五錢 銀花 三錢 鈎藤鈎 三錢 鐵頭煎三碗二煎

三碗分六次服明日午前令盡間服牛黃丸紫雪丹日三次

初三 於前方內加 生地 八錢

巳巳二月 齊 四十 脈弦數而勁初因肝鬱久升無降以致陽并於上則狂心體

初三日 之虛以用勝而更虛心用之強因體虛而更強間日舉發氣伏最深已難

調治今歲又係風木司天有木火相攝之象勉與補心體瀉心用兩法

洋參三錢 天生地一兩 丹參三錢 白芍六錢 生龜版一兩 黃柏三錢 麥冬

不去心 蓮子心一錢 山連三錢 丹皮四錢 煮三碗分三次服

外用紫雪丹六錢每次一錢與此方間服

初六日 操持太過致傷心氣之狂疾前用補心體瀉心用攝心神已見大效脈勢

亦減經謂脈小則病退是也

洋參三錢 女貞子四錢 丹皮五錢 龜版二兩 龍膽草一錢 山連三錢 白芍

六錢 黃柏炭二錢 蓮子五錢 麥冬六錢 不去心 鐵落水煎煎三杯分三次服外

以米醋一黃酒盃冲

廿七日 某 左脈弦勁經謂單弦飲滯五日前因觀劇後做惡夢遂病狂肢厥經

謂陽竝於上則狂兩陰交盡則厥靈樞有淫邪發夢一卷大意以五臟偏

勝非因夢而後病也前人有諸般怪症皆屬於痰之論雖不盡然然此症

現在咳嗽塊痰左脈單弦應作痰治

石菖蒲二錢半夏五錢 茯神塊五錢 天竺黃二錢 丹皮三錢 白附子二錢

煮三杯分三次服先服陳李濟牛黃清心丸一二九溫開水調服

廿八日 狂而厥左脈單弦咳嗽塊痰昨議應作痰治今日左脈漸有和平之象證

現於外者亦效但形貌怯弱色白而嫩脈亦不壯此症之痰究因驚起凡神氣壯者不驚況驚後惡夢夢後大汗其為陽虛神怯顯然此症將來必歸大補而後收功現在不得以攻痰見效而忘其虛怯與化痰之中微加益氣

半夏五錢 茯神塊五錢 秋小麥八錢 麥冬五錢 不去心 石菖蒲一錢 大棗二枚

煮三杯分三次服

廿九日 體虛有痰之症不能純治一邊今日脈微滑數於昨日方法中少加逐痰

茯神塊五錢 半夏五錢 陳膽星一錢 白附子二錢 麥冬三錢 不去心 秋小麥一錢

合石菖蒲一錢五分煮三杯分三次服 先服牛黃清心丸半丸

初一日 昨日稍加逐痰痰出如許大勢安靜但多怒耳右脈仍滑痰未淨也

決神塊 三錢半 夏 六錢 石菖蒲 一錢 代赭石 煨飛 五錢 白附子 二錢 秋小麥 八錢

旋覆花 包三錢 炙甘草 一錢 煮三杯分三次服

其後痰去以大補心脾而安

十月初二日 鮑三十歲 大狂七年先因功名不遂而病本京先醫市醫儒醫已歷不少

既而徽州醫杭州醫蘇州醫湖北醫所閱之醫不下數十百矣大概補虛者多攻實者少間有已時不旋踵而即發余初診時見其蓬首垢面下體俱赤衣不遮身隨着隨毀門牕粉碎隨釘隨拆鎖靠手足外有鐵索銅鎖大石磨盤上言語之亂形體之羸更不待言細詢其情每日非見婦人不
可婦人不願見彼竟開不可言叫號聲嘶哀鳴令人不忍聞只得令伊姬妾強侍之然後少安次日仍然無一日之空診其脈六部弦長而勁余曰

此實症非虛症也於是用極苦以瀉心膽二經之火瀉心者必瀉小腸病在臟治其腑也膽無出路借小腸以爲出路亦必瀉小腸也

龍膽草 三錢 天冬 三錢 細生地 三錢 胡黃連 三錢 麥冬 三錢 粉丹皮 三錢

錢 煮三杯分三次服 服二帖大效妄語少而舉動安靜

初三日見其效也以爲久病體虛恐過剛則折用病減者減其製例於原方減苦

藥加補陰之甘潤

初五日病家來告云昨服改方二帖病勢大重較前之叫哮妄語加數倍之多無

一刻之靜此症想不能治諒其必死先生可不必再診矣余曰不然初用重劑而大效繼用輕劑加補陰而大重吾知進退矣復診其脈弦長而數於是重用苦藥

龍膽草 六錢 天冬 五錢 真雅連 五錢 洋蘆薈 六錢 麥冬 三錢 烏梅肉 五錢 胡黃連 五錢 秋石 二錢 煮三碗分次服 服此方一氣六帖一日較一

日大效至十一日大爲明白於是將其得病之由因伊念頭之差因未識文章至高之境卽能至高尙有命在非人力所能強爲何怒之有人生以體親心爲孝痛乎責之俯首無辭以後漸減苦藥加補陰半月以後去刑具着衣冠同跪拜神識與好人無異服專翁大生膏一料而大壯下科竟中矣

章氏

四十歲

先是二月間病神識恍惚誤服肉桂熟地等補藥因而大狂余於三

月間用極苦以折其上盛之威間服芳香開心包醫治三十日而愈但脈仍洪數余囑其戒酒肉服專翁大生膏補陰配陽彼不唯不服尤藥至午節大開酒肉於是狂不可當足臭遠聞至鄰不時脫淨衣褲上大街一二男子不能搏之使回五月十四日又延余診視余再用前法隨效二三日仍然如故蓋少陽相火旺極挾制君主行令藥雖暫開其閉暫折其威相火一動而仍然如故延至六月十六日午刻復自撕碎其褲人不及防而

出大門矣余坐視不忍復自慚無術以已其病因謂其胞弟曰此症非打之使極痛令其自着褲也不可蓋羞惡之心亦統於仁能仁則不忍忍則不仁不仁之至羞惡全喪打之極痛則不能忍不忍而仁心復而羞惡之心亦復矣此先聖王撰作教刑之義也伊弟見其乃姊如是景況羞而成怒以保父母體面爲義於是以小竹板責其腿令着褲彼知痛後而自着衣着後稍明次日十七日立秋余與大劑苦藥一帖而全愈蓋打之功與天時秋金之氣藥之力相須而成功也後以專翁大生膏而收全功

丁亥三月十七日 富二十歲 陽并於上則狂先以極苦折其上盛之威左脈洪大膽無出

路濁膽者必瀉小腸心主言多言者必瀉心瀉心者亦必瀉小腸小腸火腑非苦不通

龍膽草 四錢

天冬 三錢

生牡蠣 打碎五錢

洋薔薇 三錢

麥冬 四錢

不去心

胡黃連

三錢 細生地 五錢

丹皮 三錢

鐵落水煎煮三杯分三次服

二帖

日十 狂病與經苦瀉小腸已效仍宗前法少加收攝陰氣餘有原案以前人誤

下大便太稀故也

龍膽草 三錢 天冬 三錢 生薑甲 打五錢 洋蘆薈 二錢 麥冬 不去心 生牡蠣

五錢 胡黃連 三錢 丹皮 五錢 五味子 一錢 次生地 五錢 鐵落水煮成去渣

加陳米醋半酒杯分三次服

日廿 狂病與育陰兼瀉小腸病退其半脈之洪大者亦漸小經謂脈小則病退

宗其法而減其製

龍膽草 二錢 天冬 二錢 牡蠣 五錢 洋蘆薈 一錢 麥冬 不去心 白芍 三錢 胡

黃連 二錢 丹皮 三錢 秋石 一錢 細生地 五錢

鐵落水煮三杯分三次服 四帖

日廿六 狂病左關洪大有力得苦藥反大於前議進法餘有原案

龍膽草 五錢 知母 四錢 天門冬 四錢 洋蘆薈 五錢 丹皮 二錢 細生地 二錢

胡黃連 五錢 秋石 一錢 鐵落水煎成三杯加陳米醋一酒杯分三次服其

碧雪丹仍服

丁亥三月 十八日 彥 廿一歲 狂病有年六脈洪大有力左關更甚與極苦折其上盛之威

龍膽草 三錢 胡黃連 三錢 麥冬 三錢 不去心 洋蘆薈 三錢 細生地 三錢 丹皮 三錢

錢 煮二杯分二次服 碧雪丹 二錢 溫開水冲

虛勞

伊氏 二十歲 勞傷急怒吐血二者皆治肝絡腎者不識見血投涼以致胃口爲苦

寒傷殘脾陽腎陽亦爲苦寒滑潤伐其生發健運之常此腹痛晨泄不食脈沉弦細之所由來也按三焦俱損先建中焦補土可以生金腎關之虛亦可仰賴於胃關矣

茯苓塊 三錢 人參 一錢 蓮子 五錢 去心 扁豆 一錢 茨實 三錢 水糖 三錢 廣皮

炭 一錢 煮一大碗緩緩服 多服爲宜

甲子四月 陳氏三十歲 脈弦細失音謂之金碎不鳴 暮熱不食 食則嘔 亦係三焦

俱損爲難治

茯苓塊 二錢 洋參 二錢 冬桑葉 一錢 甜杏仁 三錢 沙參 二錢 白扁豆 五錢

柏子霜 三錢 冰糖 三錢 胡桃肉 三錢

煮三杯分三次服 另含鮑魚片洋參片

甲子四月 陳氏三十歲 左脈搏大下焦肝腎吐血上焦咳嗽中焦不食謂之三焦俱

損例在不治勉議三焦俱損先建中焦法

茯苓塊 二錢 沙參 三錢 蓮子 三錢 焦白芍 一錢五分 桂枝 二錢 芡實 三錢 白扁

豆 三錢 桑葉 二錢 冰糖 三錢 胡荽肉 三錢

煮三杯分三次服 服此方四帖後能食

乙酉四月 施氏二十歲 形寒而六脈弦細時而身熱先天不足與諸虛不足之小建

中法

白芍 六錢 炙甘草 三錢 生薑 四錢 桂枝 四錢 膠飴 一兩去渣後化入 大棗 去核四

枚 煮三杯分三次服

八月初二日 前方服過六十劑諸皆見效陽雖轉而虛未復於前方內減姜桂之半

加柔藥兼與護陰

大生地 五錢 麥冬 四錢不去心 五味子 二錢

乙酉五月初二日 姚三十歲 六脈弦細而緊勞陽吐血諸虛不足小建中湯主之

白芍 六錢 炙甘草 三錢 生薑 五錢 桂枝 四錢 膠飴 化入一大棗 三枚 茯苓 四錢

煮三杯分三次服 共服二十一帖愈矣

乙酉五月初三日 李廿四歲 每日五更胃痛欲食得食少安胃痛則背冷如冰六脈弦細

陽微是太陽之陽虛累及陽明之陽虛陽明之陽虛現症則太陽之陽更

覺其虛此等陽虛只宜通補不宜守補 桂枝 八錢 廣皮 四錢 川椒炭 五錢 半夏 六錢 乾姜 四錢 煮三杯分三次服

十四 背寒減腹痛下移減桂枝加茱萸良姜

乙酉五月十八 傳歲 六脈弦細而紫吐血遺精陽氣不攝胃口不開法當與建中

復其陽奈酒客中焦溼熱聚不可與甘改用辛淡微甘以和胃胃旺得食而後諸虛可復也

半夏 五錢 雲苔塊 五錢 麥冬 三錢 不去心 白芍 五錢 生薏仁 五錢 神麩 炒五錢

桂枝 三錢 廣皮炭 三錢 姜汁 每杯點 煮三杯分三次服

廿二 業已見效胃口得開進食脈尚弦緊多服為宜

乙酉五月十五 沈歲 幼孩脈雙弦而細緊瘰癧結核胃陽不開色白食少且嘔形

體羸瘦與通補胃陽

雲苔塊 四錢 半夏 四錢 生薑 三錢 白扁豆 四錢 廣皮 炒二錢 煮三杯分三

次服

大月十 前藥已服十二帖嘔止胃開腹微脹脈有回陽之氣於前方加厚樸杉

吳氏醫案 虛勞

皮消脹脹消後按服後方化結於前方內去生姜廣皮加香附土貝母忍冬藤青橘葉海藻以化瘰癧結核

乙酉五月 錢廿七 六脈弦緊胃痛久病在絡當與和絡

降香末 三錢 桂枝尖 三錢 烏藥 二錢 小茴香 炒炭 二錢 半夏 三錢 歸身 二錢

公丁香 八分 良姜 一錢 生姜 三片 煮三杯分三次服 此方服七帖後痛

止以二十帖爲末神麴糊丸服過一料

八月十九日 六脈弦細而緊臟氣之沉寒可知食難用飽稍飽則腹脹食何物則噁

何氣間有胃痛時皆腑陽之衰也陽虛損症與通補臟腑之陽法大抵勞

病勞陽者十之八九勞陰者十之二三不然經何云勞者溫之世人愈以

六味八味治虛損人命其何堪哉 永戒生冷 暫戒猪肉介屬

雲苓塊 五錢 半夏 六錢 公丁香 二錢 白薤仁 三錢 良姜 三錢 小枳實 二錢

益智仁 三錢 生姜 五錢 廣皮炭 四錢 川椒炭 三錢 煮三杯分三次服

經謂必先歲氣毋伐天和今年陽明燥金太乙天符故用藥如左他年溫熱宜減

廿四

前方已服五帖脈之緊無胃氣者已和痛楚已止頗能加餐神氣亦旺照前方減川椒一錢公丁香一錢再服七帖可定九方

三十

前因脈中之陽氣已回頗有活潑之機恐剛燥太過減去川椒丁香各一錢今日診脈雖不似初診之脈緊亦不似廿四日脈和肢涼陽微不及四末之故與前方內加桂枝五錢再服七帖

九方

諸症向安惟六脈尚弦與通補脾胃兩陽

雲苓塊

八兩

人參

二兩

益智仁

四兩

生薏仁

八兩

半夏

八兩

小枳實

二兩

於白朮

四兩

廣皮

四兩

白蒺藜

一兩

其爲細末神麴八兩煎湯法丸如梧

子大每服二三錢日再服日三服自行斟酌

備用方

陽虛之體質如冬日畏寒四肢冷有陽微不及四末之象服此方五

吳氏醫案

虛勞

三

七帖以充陽氣

桂枝 四錢 甘草炙 三錢 生薑 五錢 白芍 六錢 膠飴 去渣化入一兩 大棗 去核三枚 煮

二杯分三次服 此方亦可加綿黃耆人參雲苓白朮廣皮

乙酉八月十四日 譚七歲 病後六脈弦細而緊絕少陽和之氣形體羸瘦幸喜胃旺可

以守補與形不足者補之以味法

白芍 六錢 雲苓塊 四錢 甘草炙 三錢 桂枝 四錢 炙黃耆 四錢 生薑 三片 人

參 二錢 桂圓肉 三錢 大棗 去核二枚 去渣後 膠飴 一兩 煮三杯分三次服

陳歲 十九 脈虛數頭口眩冒暮有微熱飲食少減面似桃花身如柳葉與二甲復

脈法

熟地 六錢 生鱉甲 八錢 白芍 生六錢 麥冬 不去心 生牡蠣 五錢 麻仁 二錢

呵膠 三錢 炙甘草 六錢 煮三杯分三次服 服廿帖紅退量止食進後用

專弱大生腎四觔收功

李四十歲 面赤舌絳脈虛弦而數聞婦人聲則遺令其移居至大廟深處與三甲

復脈法

乾地黄 麥冬 生鱉甲 生白芍 生龜版 炙甘草

生牡蠣 阿膠 麻仁 煮 杯分 次服 服四十帖由漸而

效後以天根月窟膏一料計四十劑收功

羅四十歲 精關開泄太早兼之讀書謀慮遺滑多年耳鳴目至暮昏頭暈頭中覺

有物旋轉時忽響精神不振飲食短少與專翕大生膏每日一兩服至二

年始愈

常四十歲 久遺脈弦細與桂枝龍骨牡蠣湯服六十帖而愈

吐血

王 脈弦如刃吐出血後左脇脹痛喉中如有物阻治在肝絡使血不瘀則吐

血可止止後當與補陰

吳氏醫案

虛勞 吐血

甚

新絳紗三錢 礞金二錢 降香末三錢 旋覆花包三錢 桃仁錢炒三元 胡索二錢

歸橫鬚二錢 丹皮三錢 蘇子霜二錢 煮三杯分三次服

又 如刃之脈已見平減但虛細如故耳

降香末三錢 丹皮炒五錢 細生地三錢 新絳紗三錢 歸鬚二錢 焦白芍三錢

旋覆花包三錢 香附製一錢 廣鬱金二錢 煮三杯分三次服

又 肝爲剛臟勁氣初平未便臑補取鬆靈之能入肝絡者宜之

遼沙參三錢 麥冬不去心五錢 白蒺藜三錢 細生地三錢 丹皮炒五錢 廣鬱金二錢

錢焦白芍六錢 歸身一錢五分 生甘草一錢 整石斛三錢 桑葉一錢 煮三杯分

三次服

又 昨日仍瘀血吐出今尙未可呆補

細生地三錢 沙參三錢 焦白芍三錢 羚羊角二錢 麥冬不去心五錢 沙蒺藜二錢

錢整石斛五錢 當歸一錢五分 茶菊花二錢 炒丹皮五錢 桑葉一錢 生甘草一錢五分

錢煮三杯分三次服 外另服新絳紗三錢

普女廿二歲 大凡吐血左脈堅搏治在下焦血分右脈堅搏治在上焦氣分又有

心血肝血大腸血小腸血胃血衝脈血各種不同豈一概見血投涼所可治哉無怪室女童男勞瘵乾血之多皆世無明眼醫士識病故也此症左脈沉大有力類緊不甚較體厚色白少腹痛小便短赤咳吐痰紫纖見鮮色喉中鹹此衝脈襲受寒邪致經不得行倒逆而吐耳大忌柔潤寒涼議溫鍾衝脈行至陰之瘀濁使經得行而血症愈矣苦辛通法

川棟子 三錢 降香 三錢 兩頭尖 二錢 小茴香 二錢 桃仁 三錢 琥珀屑 沖三

紫石英 三錢 歸鬚 二錢 韭白汁 三匙 煮三杯分三次服

壬戌八月 羅 三十 右脈浮洪咳痰吐血唇絳治上焦氣分

茯苓 五錢 沙參 三錢 生扁豆 五錢 生薏仁 五錢 連翹 八分 冬桑葉 二錢

杏仁泥 二錢 煮三杯分三次服

九月初二日 血後咳不止進食不香右脈不浮而仍洪兼與養陽明之陰

沙參三錢 生薏仁三錢 扁豆三錢 麥冬三錢 茯苓塊三錢 百合一錢 玉竹

二錢 甜杏仁二錢 桑葉一錢 五分 煮三杯分三次服

初五日 諸證俱退惟進食不旺右脈大垂尺澤先與甘寒養胃陰

大麥冬六錢 不去心 沙參三錢 生扁豆三錢 細生地三錢 玉竹三錢 炒香秋梨汁

一杯 甜杏仁三錢 桑葉一錢 煮三杯分三次服

初九日 甘潤養陰

大生地三錢 沙參三錢 火麻仁二錢 甜杏仁二錢 去皮尖 麥冬六錢 不去心 柏子霜

二錢 生白芍三錢 桑葉一錢 生扁豆三錢 炒玉竹三錢 冰糖二錢 煮三杯

分三次服

癸亥七月廿五日 伊四歲 六脈弦數兩關獨浮左更甚右脇痛胸中痞塞肝鬱吐血先

理肝絡

新絳紗 三錢 降香 二錢 炒丹皮 二錢 旋覆花 包二錢 歸麋 一錢 蘇子霜 三錢

廣鬱金 二錢 煮三杯分三次服

三十日 血家脇痛與和肝絡脇痛已愈但咳嗽黃痰氣短懶食脈弦細數譙甘能

益氣補土生金清涼降熱而護胃陰令能食

沙參 三錢 細生地 三錢 桑葉 一錢 麥冬 不去心三錢 甜杏仁 三錢 藕汁 沖一酒

玉竹 炒香二錢 葶薺汁 沖一酒 煮三杯分三次服 四帖

八月初四日 血家脇痛不食與和肝絡養胃陰兩法俱效仍咳嗽兼胸中隱痛動則

喘氣虛金匱謂諸虛不足與小建中復其陽和營衛令能食從食中復其

虛診脈弦爲減正合其論但脈數而痰濃陰亦大虧議復脈法兩補陰陽

方中亦包建中法在內仍然甘能益氣而補土生金也但肆中阿膠不佳

又兼滑膩且大便滯以牡蠣易之

沙參 三錢 大生地 三錢 麻仁 一錢 麥冬 不去心三錢 左牡蠣 三錢 大棗 去核二

白芍炒三錢 炙甘草三錢 姜汁沖二匙 桂枝二錢 煮三杯分三次服

初九日血後咳嗽氣虛用復脈法甘緩理中補土生金之義飲食漸加是其大效

如果胃土旺無不生金之理如果飲食加無不可復之虛勞因前法而進之

洋參炒二錢 大生地六錢 麻仁二錢 桂枝三錢 杭白芍六錢 芡實三錢 麥冬

不去心炙甘草五錢 蓮子去心留皮三錢 牡蠣五錢 生薑汁二小匙 大棗去核二錢

甲三錢 煮三碗分三次服

九月初七日現因相火行令血復來右脈大暫清肺胃

麥冬不去心六錢 北沙參三錢 白花百合二錢 石斛一兩 甜杏仁去皮尖研三錢 秋梨

五錢 桑葉三錢 生扁豆三錢 煮三杯分二次服

史四十歲酒客脈洪面赤吐狂血不止仍然飲食如常議金匱大黃黃連瀉心湯

急瀉三陽實火而血自止

又 前法已效不可再進議甘涼法服三日再議

又 前以瀉心法大效未敢再進血復來議再用瀉心法減其製

又 昨用瀉心法減其製雖見效而血未盡今仍照原方服二日大效以後永不再發

癸亥九月三十日 唐三十歲 凡咳血者右脈堅搏治在上焦氣分

白扁豆皮 三錢 桃仁 二錢 白茅根 三錢 炒黑梔皮 一錢 生薏仁 三錢 桑葉

一錢 側柏葉炭 三錢 煮三杯分三次服 二帖而愈

乙丑三月十七日 陳三十歲 吐血左下脈堅搏治在下焦血分

沙參 三錢 細生地 五錢 丹皮 五錢 白芍 四錢 黃芩炭 二錢 麻仁 三錢 阿膠

二錢 天門冬 三錢 三七 一錢 雲連 一錢 炒黑麥門冬 四錢 甘草 一錢 水八杯煮

取三杯分三次服

廿三日 左脈沉弦細數鋒鏦如刃吐血左手脈堅搏治在下焦血分

沙參三錢 細生地五錢 阿膠二錢 麥冬不去心四錢 茯苓塊三錢 天冬三錢 元
參三錢 霍石斛五錢 麻仁三錢 白芍四錢 黃芩炭二錢 甘草一錢 丹皮五
錢 煮四杯分四次服

廿六日 脈數減弦剛甚

洋參三錢 直大生地五錢 阿膠三錢 麥冬四錢 茯苓塊三錢 麻仁二錢

白芍炒四錢 生牡蠣三錢 炙甘草五分 丹皮五錢 煮四杯分四次服

丙寅二月 初九日 趙 勞陽吐血脈雙弦金匱謂大則為虛弦則為減虛弦相搏其名

曰革男子失精亡血諸虛不足小建中湯主之

白芍六錢 炙甘草三錢 生薑五片 桂枝四錢 膠飴去渣後化入一兩 大

棗去核二枚

水五碗煮取兩碗渣再煮一碗分三次服輕者日一帖重則日再服

丙寅二月 廿四日 章 右脈空大左脈弦細血後咳吐濁痰腥臭真液不守陰火上升

克金非純補純清之症然而慎矣

沙參三錢 甜杏仁二錢去皮尖研 扁豆生三錢 麥冬三錢不去心 枇杷葉蜜炙一錢

桑葉三錢 天冬三錢 五味子一錢五分 白花百合一錢 阿膠三錢 霍石斛五錢

煎湯代水 濃煎兩杯分二次服

廿八日 服少歛痰咳亦減切戒用心

沙參三錢 生白扁豆三錢 阿膠三錢 洋參一錢五分 製五味子三錢 牡蠣生三錢

麥冬三錢不去心 白花百合二錢 桑葉二錢 天冬三錢

水五杯煮取兩杯渣再煮一杯服日二帖

三月初三日 脈大歛戢古所謂脈小則病退是也頗有起色若得舌苔化去則更妙

矣

生薏仁五錢 沙參三錢 天冬三錢 生白扁豆三錢 洋參一錢五分 桑葉三錢 製

五味子三錢 麥冬三錢不去心 梨汁沖一小杯 鮮蘆根汁沖五杯 煮三杯分三

次服 四帖

乙酉四月 廿八日 胡一歲 榮陽吐血汗多足麻六脈弦細不數小建中湯主之

白芍 六錢 甘草 炙三錢 生姜 五錢 桂枝 四錢 膠飴 後入 一兩 大棗 三枚 煮三杯

去渣後將膠飴化入 上火二三 分三次服

五月初六日 汗減足麻愈食少加原方再服

十五日 前藥已服十四帖諸症皆愈惟咳嗽未止於前原方 加雲苓 半夏

乙酉正月 初十日 沈四歲 六脈弦數勞陽吐血建中湯主之

白芍 炒六錢 丹皮 三錢 人參 三枚 桂枝 三錢 甘草 炙三錢 姜汁 沖三匙 麥冬 不去心 五錢

錢膠飴 一兩 去渣後化入 煮三杯 分三次服

十四日 肝鬱脇痛病名肝着治在肝經之絡經藥弗愈也

新絳紗 三錢 半夏 三錢 蘇子霜 三錢 旋覆花 包三錢 青皮 二錢 歸橫類 一錢

降香末 三錢 吳萸 一錢 廣皮炭 一錢 廣鬱金 一錢 煮三杯 分三次服

十五

六脈弦勁前用建中現在右脈已和左手仍勁胸中咳甚則痛間有一二口紫色之血按肝脈絡胸是絡中尚有瘀滯且與建中宜紹

新絳紗三錢 降香三錢 丹皮炭三錢 旋覆花包三錢 鬱金二錢 蘇子霜二錢

桃仁泥三錢 歸鬚二錢 廣皮炭二錢 姜半夏五錢 煮三杯分三次服

廿一

六脈弦數以春氣在頭之故偶受微風右寸獨浮大而衄血暫與清道之風熱

白茅根五錢 甜杏仁三錢 紫菊花三錢 側柏炭三錢 桑葉三錢 鮮蘆根三

錢 黑山梔二錢 煮三小杯分三次服

七十

吳 周身癢不可當脈洪吐狂血與大黃黃連瀉心湯以後永不發

五十

史 酒客大吐狂血成益六脈洪數面赤三陽實火為病與

大黃六錢 黃連五錢 黃芩五錢

瀉心湯一帖而止二帖脈平後七日又發脈如故又二帖

吳氏醫案

吐血

芫

吳二十歲 每日飽食就牀脾陽致困因失其統血之職此爲傷食吐血脈弦與飢

中黃土每日一勛分三次煎服將盡半月而愈戒其夜食永遠不發

乙酉十一月十一日 岳二十歲 勞傷吐血兩脇俱痛六脈弦緊誤補難愈凡勞傷肝鬱必有

瘀血故症現脇痛一以活絡爲主俟瘀血去淨而後可以補虛

新絳紗 二錢 桃仁 三錢 蘇子霜 二錢 旋覆花 包三錢 歸鬚 三錢 丹皮炭 五錢

廣鬱金 二錢 降香 三錢 煮三杯分三次服 四帖

廿二日 覆診脈之弦緊雖減而未和緩脇痛雖大減而未盡除與原方去桃仁加

細生地 五錢

十二月六日 六脈弦細紫金匱謂脈雙弦者寒也弦則爲減男子失精亡血小建中

湯主之勞傷吐血愈後以建中復陽生陰

白芍 焦六錢 麥冬 三錢 大棗 去核桂枝 三錢 丹皮 三錢 生薑 三片 炙甘草

三錢 膠胎 一兩 去渣後化入 煮三杯分三次服

上火二三沸換勻

十八諸症全愈胃口大開虛未全復於原方加麥冬二錢使分佈胃中津液於

十二經臟之虛則從飲食中復矣

戊子七月十七日 汝三十歲本有肝鬱脇痛症又受秋涼燥金之氣不唯腹痛大發且有

表症午後身熱雖見血乃燥氣非溼溫也治在肝經與絡也

桂枝尖三錢 柴胡三錢 淡吳萸二錢 姜半夏四錢 歸鬚二錢 蘇子霜二錢

降香末三錢 廣皮三錢 川椒炭三錢 煮三杯分三次服 燥退去柴胡服此方一

二日燥氣已退去柴胡再服二三帖

日 肝鬱脇痛乃肝絡中有瘀血方痛古人僉用新絳旋覆花湯橫走絡者也

後人多用逍遙散監走經者也故多不見效況久病必治絡乎

新絳紗三錢 桃仁二錢 廣鬱金二錢 旋覆花包三錢 歸鬚二錢 蘇子霜二錢

姜半夏三錢 香附三錢 廣皮炭二錢 降香末二錢 煮三杯分三次服

日 有肝鬱者必克脾脾受克者必停飲飲停射肺者必咳嗽清胃者必不寐

故靈樞謂胃不和則卧不安飲以半夏湯覆杯則寐法

姜半夏 二兩 秫米 二合

急流水八杯煮三杯分三次服切戒生冷猪肉

巳丑二月 初九日 王五歲 咳嗽胸滿短氣自汗夜甚大便燥六脈俱弦而微緊雖嗽甚

見血的係痰飲而非虛勞法宜溫通陽氣和胃逐飲忌生冷猪肉介屬鹹味

雲苓塊 六錢 桂枝 四錢 焦白芍 三錢 姜半夏 六錢 杏仁 五錢 五味子 四錢

小枳實 五錢 廣皮 五錢 乾姜炭 四錢 麻黃根 三錢 甘草 炙三錢

甘瀾水六大茶杯煮成兩茶杯渣再以六杯水煮兩杯日三夜一分四次

服○服此方四帖吐血喘滿全愈咳嗽亦愈六七

方論按痰飲十數日大便燥結乃肺氣不降肺與大腸相表裏肺痺則大腸亦痺開肺痺即所以開大腸之痺也故此方重用杏仁又由於津液屯聚胃

中不得下行以致大腸乾燥故用枳實橘皮直通幽門俾津液下行又辛能潤也再九竅不利皆屬胃病故重用半夏合橘皮和胃病由痰飲逐痰即所以和胃也故其應如響今人僉用大黃苦寒堅陰甚至用元參麥冬生地作增水行舟之計豈非背道而馳哉

初十照前方再服一帖

十一少陽膽絡頭痛與清膽絡之熱不犯中下二焦今日頭痛全止六脈沈弦

不數咳嗽喘滿短氣自汗不食面黃肢微腫純然痰飲見症斷無補陰助邪之理議病痰飲者當以溫藥和之

桂枝木 三錢 杏仁 三錢 焦白芍 二錢 麻黃根 三錢 去蘆 乾薑 三錢 五味子 一錢五分

蘆半夏 五錢 廣皮 三錢 炙甘草 三錢 小枳實 三錢 煮三杯分三次服

壬辰八月三十歲 六脈弦細而沈吐血久而不止久病當於絡中求之且先吐

紅血後吐黑紫絡中顯有瘀滯金匱謂凡病至其年月日時復發者當下

之此下字須活看謂拔去病根則不再發矣金匱又謂脈双弦者寒也此證斷不可用陰柔呆賦之品致永無愈期議先與溫通絡脈拔去病根繼以建中收功

新絳紗

三錢

桂枝

三錢

姜半夏

三錢

旋覆花

包三錢

歸鬚

二錢

橘皮炭

二錢

蒼塊

三錢

乾姜

炒牛黑

一錢

煮三杯分三次服

飭血

巳丑正月十六日

暨四十

衄血右脈洪大誤用大劑當歸以致大衄不止無論辛走行

氣之藥不可用即涼血和血而不走清道者亦不見效議清清道之熱

側柏炭

五錢

連翹

連心

銀花炭

三錢

黑山梔

四錢

桑葉

三錢

白茅根

兩錢

香花

三錢

煮三杯分三次服

廿一

衄雖止而氣血兩虛脈雙弦而細法當補陽以飭血初罷之候且與復脈法

大生地 五錢 麥冬 四錢 炒白芍 三錢 生鱉甲 五錢 阿膠 二錢 炙甘草 四錢
生牡蠣 五錢 麻仁 二錢 煮三杯分三次服

廿五日 前日衄血初止六脈俱弦而細氣血暴虛也似當補陽而未敢驟補與一

甲復脈湯四帖今日六脈俱大而滑氣血暴復也仍與翁攝真陰與三甲

復脈湯法

大生地 六錢 白芍 四錢 生牡蠣 五錢 生鱉甲 五錢 麥冬 四錢 不去心 生阿膠 三錢
生龜版 五錢 麻仁 三錢 炙甘草 五錢 煮三杯分三次服

便血

癸亥十二月初二日 毛十二歲 糞後便血責之小腸寒溼不與糞前為大腸熱溼同科舉世

業醫者不知有此無怪乎數年不愈也用古法黃土湯

竈中黃土 二兩 生地 三錢 黃芩 三錢 炒三製蒼朮 三錢 阿膠 三錢 甘草 三錢 炙三熟

附子 三錢 白芍 三錢 全歸 一錢 水八碗煮成三碗分三次服

吳氏醫案

衄血便血

初七日 小兒脈當數而反緩糞後便血前用黃土湯業已見效仍照前方加剛藥

即於前方內去白芍全歸加

附子一錢 蒼朮二錢

戊寅七月初一日 孫三十八歲 其人素有便紅之症自十八起至今不絕現在面色萎

黃失血太多急宜用古法有病則病受之雖暑月無碍也

方法分兩同前 服一帖即止次日停服後半月復發再服一帖全愈

福廿九 初因恣飲冰振黃酒冰浸水果又受外風致成風水頭面與身腫大難

狀腫起自頭先與越脾湯發其汗頭面腫消繼與利小便下截腫消脹消
後與調理脾胃自上年十月間服藥起至次年三月方止共計湯藥一百
四十三帖其病始安囑其戒酒肉生冷不意夏熱甚時仍恣吃冰浸水果
自八月後糞後大下狂血每次有升許之多余用黃土湯去柔藥加剛藥
每劑黃土用一觔附子用六錢或一兩他藥稱是服至九日餘帖始大愈

乙酉九月三十日 胡三十歲 本係酒客濕中生熱久而發黃顏色暗滯六脈俱弦其來也

漸此非陽黃況糞後見血又謂小腸寒濕乎

竈中黃土 八兩 猪苓 三錢 附子 熟三錢 雲茯苓皮 三錢 澤瀉 三錢 茵陳 五錢

炒蒼朮炭 三錢 黃柏 三錢 煮三杯分三次服 五帖全愈

乙酉四月廿二日 陳四歲 糞後便血寒濕為病誤補誤涼胃口傷殘氣從溺管而出若

女子陰吹之屬瘕氣皆然左脇肝部卧不着席得油膩則寒戰叢雜無倫
幾於無處下手議治病必求其本仍從寒濕論治合能安食再商與黃芩

湯中去柔藥加剛藥

竈中黃土 四兩 雲苓 五錢 川椒炭 三錢 茅山蒼朮 生三錢 附子 熟三錢 香附 三錢

錢 生益智仁 三錢 廣皮 三錢 生薑 三錢 煮三杯分三次服

五月初一日 照原方再服二帖

初三日 心悸短氣加小枳實 四錢 乾姜 一錢 四帖

日一 於原方去川椒炭 五帖

日一 諸症皆效大勢未退左脈緊甚加熟附子一錢 乾姜一錢 降香末三錢 三

帖

日七 諸症向安惟糞後便血又發與黃土湯法糞後便血乃小腸寒濕不與糞

前為大腸濕熱同利

竈中黃土 八兩 附子 熟四錢 黃芩炭 四錢 雲茯苓塊 五錢 蒼朮 炒四錢 廣皮炭

三錢 生益智仁 二錢 煮三杯分三次服 以血不來為度

七月十四日 面色青黃滯暗六脈弦細無陽胃陽不振暫與利胃其黃土湯俟便紅

發時再服

姜半夏 六錢 益智仁 三錢 川椒炭 一錢 雲苓塊 五錢 白蔻仁 一錢 廣皮 三

錢 生薏仁 五錢 煮三杯分三次服

日七 於原方加桂枝 五錢

十一月十五日肝鬱夾痰飲寒濕爲病前與黃土湯治糞後便血之寒濕茲便紅已止

繼與通補胃陽現在飲食大進諸症漸安惟六脈弦細右手有胃氣左手弦緊痰多畏寒脇下仍有伏飲與通補胃陽兼逐痰飲

姜半夏八錢 桂枝六錢 川椒炭三錢 雲苔塊五錢 白芍三錢 炒三乾姜三錢 旋

覆花包三錢 香附四錢 廣皮五錢 小枳實三錢 煮三杯分三次服

初十日脈弦緊痰多畏寒衝氣上動與桂枝茯苓甘草湯合桂苓加桂湯法先

伐衝氣

桂枝一兩 雲苔塊連皮二兩 全歸三錢 獨桂去粗皮五錢 炙甘草五錢 川芎二錢

三杯分三次服 服一帖衝氣已止當服藥後吐頑痰一口

十一日衝氣已止六脈緊退而弦未除可將初十日方再服半帖以後接服廿九

日改定方以不畏寒爲度

十三日服十一月十五日疏肝藥二帖

吳氏醫案

便血

十四日 背畏寒脈仍弦緊再服十二月初十日桂枝加桂湯二帖以峻補衛陽服

藥後吐黑頭痰一口

十七日 脈仍弦緊背猶畏寒陽未全復照原方再服二劑分四日服

廿九日 前日之畏寒至今雖減而未全愈脈之弦緊亦未充和衝氣微有上動之

象可取十四日桂枝加桂湯再服二帖分四日立春以後故也

丙戌正月 初五日 六脈俱弦右脈更緊糞後便紅小腸寒濕黃土湯為主方議黃土湯

去柔藥加滲濕通陽雖白覺心中熱背心如水澆所謂白云熱者非熱也

況有惡寒乎

竈中黃土 八兩 桂枝 五錢 黃芩炭 四錢 雲茯苓塊 六錢 附子 熱四錢 廣皮 四

錢 生薑苡仁 五錢 蒼朮炭 四錢 煮四杯分四次服血多則多服血少則少

服萬一血來甚湧附子加至七八錢以血止爲度再發再服切勿聽譏

音亡轉方也

九方陽虛脈弦素有寒濕痰飲與細飲九法通陽滲濕而補脾胃

雲苓塊八兩桂枝八兩乾姜炭四兩姜半夏八兩蒼朮炭四兩益智仁四兩生薏仁八兩廣皮六兩炙甘草三兩右爲細末神麴糊丸小梧子大每服三錢日三服忌生冷介屬

初十日 糞後便紅雖止寒濕未盡脈之緊者雖減當退剛藥背惡寒未罷行濕之

中兼與調和營衛

龍中黃土一兩桂枝四錢廣皮炒一錢雲茯苓塊三錢白芍炒四錢生薑三錢生薏以仁三錢蒼朮炭三錢大棗五核姜製半夏三錢黃芩炭一錢煮三杯分三次服

腫脹

甲寅二月 陳三十 太陰所至發爲臃脹者脾主散津脾病不能散津土曰敦阜

初四日 斯臃脹矣厥陰所至發爲臃脹者肝主疏泄肝病不能疏泄木穿土位亦

腹脹矣此症起於肝經鬱勃從頭面腫起腹固脹大的係蠱脹而非水腫何以知之渴腹青筋暴起如蟲紋竝非本身筋骨之筋故知之治法以行太陽之陽泄厥陰之陰爲要醫者誤用八味丸反攝少陰之陰又重加牡蠣清陰絕陽使陽不得行而陰凝且甚六脈沈弦而細耳無所聞目無所見口中血塊累累續出經所謂血脈凝泣者是也勢太危急不敢驟然用藥思至陽而極靈者莫如龍非龍不足以行水而開介屬之翕惟鯉魚三十六鱗能化龍孫真人曾用之矣但孫真人千金原方去鱗甲用醋煮茲改用活鯉魚大者一尾得六斤不去鱗甲不破肚加葱一斤水煮熟透加醋一斤任服之服鯉魚湯一晝夜耳聞如舊目視如舊口中血塊全無神氣清爽但腫脹未除

初五日

經謂病始於下而盛於上者先治其下後治其上病始於上而盛於下者先治其上後治其下此症始於上腫當發其汗與金匱麻黃附子甘草湯

麻黃去節附子一兩炙甘草一兩煮成五飯碗先服半碗得汗止後服
不汗再服以得汗爲度

此方甫立未書分量陳頌籌先生一見云斷然無效子問曰何以不效陳

先生云吾曾用來子曰此方在先生用誠然不效予用或可效耳王先生
名謨忘其字云吾甚不解同一方也藥止三味竝無增減何以爲異用則

利陳用則否豈無知之草木獨聽吾兄使令哉余曰蓋有故也陳先生之
性情忠厚其膠最小伊恐麻黃法陽必用八分附子護陽用至一錢以監
麻黃又恐麻黃附子皆慄悍藥也甘草平緩遂用一錢二分又監制麻黃
附子服一帖無汗改用八味丸矣八味陰柔藥多乃敢大用如何能效陳
蔭山先生入內室取廿八日陳頌籌所用原方分量一毫不差在坐者六
七人皆譁然笑曰何吳先生之神也余曰余常與頌籌先生一同醫病故
知之深矣於是麻黃去淨節用二兩附子大者一枚得一兩六錢少昧黃

四錢讓麻黃出頭甘草用一兩二錢又少附子四錢讓麻黃附子出頭甘草但坐鎮中州而已衆見分量又大譚曰麻黃可如是用乎頌籌先生云不妨如有過差吾敢保衆云君用八分未敢足錢反敢保二兩之多乎頌籌云吾在菊溪先生處治產後鬱冒用當歸二錢吳兄痛責謂當歸血中氣藥最能竄陽產後陰虛陽越例在禁條豈可用乎夫麻黃之去當歸奚啻十百吾用當歸伊責之甚豈伊用麻黃又如是多竟無定見乎余曰人之所以畏麻黃如虎者爲其能大汗亡陽也未有汗不出而陽亡於內者湯雖多但服一盃或半盃得汗卽止不汗再服不可使汗淋漓何畏其亡陽哉但此症閉錮已久陰靈太重雖盡劑未必有汗余明日再來發汗病家始敢買藥而仙芝堂藥舖竟不賣謂錢字想是先生誤寫兩字主人親自去買方得藥服盡劑竟無汗

初六

衆人見汗不出愈謂汗不出者死此症不可爲矣予曰不然若竟係死症

鯉魚湯不見效矣余化裁仲景先師桂枝湯用粥發胃家汗法竟用原方
分量一劑再備用一帖又用活鯉魚一尾得四斤煮如前法服麻黃湯一
飯碗卽接服鯉魚湯一碗汗至眉上又一次汗至上眼皮又一次汗至眼
下皮又一次汗至鼻又一次汗至上唇大約每一次汗出寸許二帖俱服
完鯉魚湯一鍋合一晝夜亦服盡汗至伏兔而已未過膝也臍以上腫俱
消腹仍大

初七日經謂汗出不至足者死此症未全活雖腰以上腫消而腹仍大腰以下其
腫如故因用腰以下腫當利小便例與五苓散服至二十一日共十五天
不效病亦不增不減陳陰山云先生前用麻黃其效如神茲小便涓滴不
下奈何祈轉方余曰病之所以不效者藥不精良耳今日先生去求好肉
桂若仍係前所用之桂明日予不能立方方固無可轉也

廿二日陳陰山購得新鮮紫油安邊青花桂一枝重八錢乞余視之予曰得此桂

必有小便但惡脫耳膀胱爲州都之官氣化則能出焉氣虛亦不能化於是用五苓散二兩加桂四錢頂遼參三錢服之盡劑病者所睡係棕牀予囑其備大盆二三枚置之牀下溺完被濕不可動俟明日予親視挪牀其溺自子正始通至卯正方完共得溺三大盆有半子辰正至其家視其周身如空布袋又如腐皮於是用調理脾胃百日全愈

洪氏

六十歲

婦居三十餘年體厚憂鬱太多肝經鬱勃久矣又因暴怒重憂致成

厥陰太陰兩經脹並發水不得行腫從跗起先與腰以下腫當利小便例之五苓散法但陰氣太重六脈沈細如絲斷非輕劑所能了

桂枝

五錢

茯苓皮

六錢

肉桂

四錢

猪苓

五錢

生蒼朮

五錢

廣皮

五錢

澤瀉

五錢

老厚樸

四錢

煮三杯分三次服

前方服三五帖不效亦無壞處小便總不見長肉桂加至二三兩桂枝加至四五兩他藥稱是每劑近一觔之多作五六椀服五七帖後六脈絲毫不起腫不

消便亦不長所以然之故肉桂不佳陰氣太重憂鬱多年暴怒傷肝必有陳苑
仍用原方加雞矢醃熱淨烟六錢又加附子八錢服之小便稍通一連七帖腫
漸消飲食漸進形色漸喜於是漸減前方分量服至十四帖腫脹全消後以補
脾陽疏肝鬱收功

郭氏

六十歲

先是郭氏喪夫於二百里外其祖墓之側郭氏攜子奔喪饑不欲食

寒不欲衣悲痛太過葬後廬墓百日席地而卧哭泣不休食少衣薄回家
後致成單腹脹六脈弦無胃氣氣喘不能食唇口刮白面色淡黃身體羸
瘦余思無情草木不能治有形之病必得開其愚蒙使情志暢遂方可冀
見效於萬一因問曰汝之痛心疾首十倍于常人者何故伊答曰夫死不
可復生所遺二子恐難成立余曰汝何不明之甚也大凡婦人夫死曰未
亡人言將待死也汝如思夫念切卽死于墓側得遂同穴之情則亦已矣
雖有病何必醫醫者求其更甦也其所以不死者以有子在也夫未死以

夫爲重夫既死以教子爲重者仍係相夫之事業也汝子之父已死汝子已失其蔭汝再死汝子豈不更無所賴乎汝之死汝之病不惟無益於夫而反重害其子害其子不惟無益於子而且大失夫心汝此刻欲盡婦人之道必體亡夫之心盡教子之職汝必不可死也不可死且不可病不可病必得開懷暢遂而後可愈單腹脹死症也脈無胃氣死脈也以死症而見死脈必得心火旺相泄肝鬱之陰氣而後血脈通血脈通臟氣遂死症亦有可生之道詩云見睍曰消者是也伊聞余言大笑余曰笑則生矣伊云自此以後吾不惟不哭泣不敢憂思一味以喜樂從事但求其得生以育吾兒而已余曰汝自欲生則生矣於是爲之立開鬱方十數劑而收全功

旋覆花 新絳紗包三錢 香附 三錢 廣鬱金 三錢 姜半夏 四錢 青皮 一錢 蘇子霜 三錢 降香末 三錢 廣皮 三錢 歸橫鬚 二錢 川厚朴 三錢 煮三杯分三次服

吳氏二十歲春夏間乘舟由南而北途間溫毒愈後感受風濕內脹外腫又因寢

居肝鬱之故時常季夏左手心勞宮穴忽起勞宮毒如桃大此症有治熱
得濕治濕得熱之弊選用幼科疳後餘毒歸肺喘促咳逆之實腠利水法
加極苦合爲苦淡法俾熱毒由小腸下入膀胱隨濕氣一奔泄出也蓋勞
宮毒屬心火瀉心者必瀉小腸小腸火腑非苦不通腰以下腫當利小便
利小便者亦用苦淡也

飛滑石二兩 茯苓皮一兩 黃柏四錢 猪苓一兩 晚蠶砂四錢 黃芩四錢 澤

瀉一兩 白通草三錢 雅連四錢 煮成五杯分五次服以小便長爲度

此方服七帖分量不增不減腫脹與勞宮毒俱消以後補脾收功

乙酉五月陳二十歲脈弦細而緊不知饑內脹外腫小便不利與腰以下腫當利

小便法陽欲滅絕重加溫熱以通陽況今年燥金太乙天符經謂必先歲
氣毋伐天和

桂枝 六錢 茯苓皮 六錢 川椒炭 五錢 猪苓 五錢 生茅朮 三錢 黃皮 三錢 澤

瀉 五錢 公丁香 二錢 杉皮 一兩 厚樸 四錢 煮四林分四次服

廿五日 諸症皆效知饑腫脹消其大半惟少腹有痼竟若有一根筋吊結於原方

內減丁香一錢加小茴香三錢

乙酉十月十七日 單氏四十歲 腫脹六年之久時發時止由於肝鬱應照厥陰腹脹例治

雲苓皮 六錢 厚樸 三錢 歸樞鬚 三錢 旋覆花 包三錢 香附 三錢 大腹皮 三錢

姜半夏 四錢 青皮 二錢 廣鬱金 二錢 降香末 三錢 木通 一錢 煮三杯分三

次服不能寬懷消怒不必服藥

廿六日 服前方八帖腫脹稍退惟陽微弱加川椒 三錢 大便不通加兩頭尖 二錢

去陳苑

壬辰四月十一日 好一歲 先喘後腫六脈洪大有力左尺獨大肺腎之熱可知腰以下

腫本當利小便但不宜溫利耳且置喘於不問其如治病必求其本者何

哉

生石膏

四兩

雲苓皮

五錢

海金沙

五錢先煎代水

飛滑石

一兩

姜半夏

三錢

晚蠶

砂三錢

杏仁泥

六錢

小枳實

四錢

白通草

一錢五分

甘瀾水

八杯

煮成三杯分

三次服

三次服

十七

六脈仍洪數左尺仍獨大猶宜涼利小便

先煎飛滑石

一兩

海金沙

五錢

杏仁

六錢

生石膏

四錢

小枳實

四錢

厚樸

三錢

半半夏

五錢

晚蠶砂

三錢

橘皮

三錢

雲苓皮

五錢

白通草

一錢五分

甘瀾

水八杯煮成三杯分三次服

單腹脹

癸巳四月

初四日

毛

四十歲

病起肝鬱木鬱則克土克陽土則不寐克陰土則腹脹白鬱

則脇痛肝主疏泄肝病則不能疏泄故二便亦不能宣通肝主血絡亦主

血故治肝者必治絡

血故治肝者必治絡

血故治肝者必治絡

血故治肝者必治絡

新絳紗 三錢 香附 三錢 蘇子霜 三錢 旋覆花 包三錢 歸鬚 三錢 小茴香 三錢

姜半夏 八錢 青皮 三錢 廣鬱金 三錢 降香末 三錢 頭煎二杯二煎一杯分

三次服

初七日 服肝絡藥脹滿脇痛不寐少減惟覺胸痛按肝脈絡胸亦是肝鬱之故再

小便赤濁氣分濕也

旋覆花 新絳紗包三錢 桂枝 三錢 小茴香 炒黑三錢 川棟子 三錢 半夏 六錢 晚歸砂 三錢

降香末 三錢 歸鬚 二錢 兩頭尖 三錢 茯苓皮 三錢 橘皮 青二白通草二錢

錢煮三杯分三次服

初十日 驅濁陰而和陽明現在得寐小便少清但肝鬱必克土陰土鬱則脹陽土

鬱則食少而無以生陽故清陽虛而成胸痺暫與開痹

半夏 一兩 茯苓皮 五錢 厚朴 三錢 桂枝尖 五錢 廣鬱金 三錢 薤白 三錢 生

苡仁 五錢 小枳實 二錢 括輿 連皮仁研 三錢煮三杯分三次服

十四日

脈緩太陽已開而小便清通陽明已開而得寐能食但腹脹不除病起肝

鬱與行濕之中必兼開鬱

枳實皮 五錢 半夏 五錢 廣木香 二錢 生苡仁 五錢 厚樸 三錢 煨肉果 五錢

降香末 三錢 廣皮 二錢 白通草 三錢 廣鬱金 二錢 煮三杯分三次服

腹脹

徐三十 腹脹且痛脈弦細大便泄小便短身不熱此屬寒濕傷足太陰

桂枝 三錢 生苡仁 五錢 厚樸 三錢 猪苓 三錢 黃芩炭 一錢 乾姜 一錢 澤瀉 五錢

三錢 白通草 二錢 廣皮 二錢 煮三杯分三次服

滯下

丁氏 五十 滯下白積欲便先痛便後痛減責之積重脈遲而弦痛甚憲冷積也

非溫下不可

生大黃 五錢 厚朴 五錢 廣木香 三錢 南查炭 三錢 良姜炭 二錢 黃芩炭 三錢

吳氏醫案

單腹脹滯下

聖

錢廣皮五錢 熟附子錢五 檳榔錢三 小枳實錢二 焦白芍錢三 煮三杯三次服

梁廿八 滯下白積欲便先痛便後痛減責之有積用溫下法

生大黃三錢 酒炒黑厚朴三錢 檳榔尖一錢五分 熟附子三錢 枳實一錢五分 廣木香一錢 炒白芍二錢 廣皮二錢 炒雲連一錢 炒黃芩二錢 水五杯煮兩杯分二

次服

甲子十一張三十 月十八日張八歲 先泄而後滯下脾虛傳腎症為難治

白芍二錢 黃芩炭一錢 雅連二分 吳萸一錢 炒猪苓三錢 川椒目三錢 厚朴二錢

澤瀉三錢 生茅朮三錢 良姜二錢 生苡仁二錢 廣木香一錢 廣皮一錢 水

六杯煮取二杯渣再煮一杯分三次服

二十 先泄後滯下古云難治非一時可了且喜脈弱倘有生機

白芍錢三 真山連二錢 酒沙紅麴二錢 黃芩二錢 酒炒地榆炭三錢 歸尾一錢

厚朴去白皮三錢 小枳實二錢 廣皮二錢 檳榔一錢 廣木香一錢 煎法如

前

廿三 脈沈而有力滯下脹痛太甚便後少減片時其痛仍然議開一面用溫

下法

生大黃酒炒黑 白芍酒炒半枯 廣木香二錢 安邊桂去粗皮 黃芩酒炒半

小枳實二錢 紅麴二錢 廣皮炭二錢 真山連酒炒半 老厚朴二錢 歸尾一

錢五 水五杯煮成三杯分三次服

廿三 於二十日方內加 兩頭尖三錢

廿四 腎症復歸於脾用四苓合苓芍湯法

茯苓皮五錢 猪苓五錢 生苡仁五錢 生茅朮五錢 澤瀉五錢 廣木香一錢

焦白芍二錢 厚朴二錢 炒川連一錢 炒黃芩一錢 廣皮一錢 水八杯煮取

三杯分三次服

廿五 於前方內加 白通草二錢

廿六 肝鬱則小便亦不能通此徒用四苓不效謹開陰絡法

猪苓 三錢 小茴香 三錢 歸鬚 一錢 澤瀉 三錢 川棟子 一錢 琥珀 研 三分 降香

三錢 兩頭尖 一錢 口磨 研 五厘 桃仁 三錢 煮三杯分三次服

廿七 開陰絡已效於前方內加安邊桂 三分 鬱金 三錢 生香附 三錢

廿八 九竅不和皆屬胃病用開太陽闔陽明兼瀉心法

半夏 六錢 茯苓皮 三錢 黃芩 二錢 猪苓 三錢 生苡仁 三錢 厚朴 姜汁炒 澤

瀉 三錢 廣木香 一錢 青皮 二錢 廣皮 二錢 炒川連 一錢 乾姜 二錢 水五杯

煮取兩杯渣再煮一杯分三次服

廿九 開太陽闔陽明兼去濕中之熱

姜半夏 六錢 猪苓 三錢 黃芩 二錢 茯苓皮 三錢 澤瀉 二錢 廣木香 一錢

生苡仁 三錢 白芍 二錢 真山連 一錢 川草薢 二錢 廣皮 二錢 白通草 一錢

煮三杯分三次服

三十 糞後帶血加黃土湯法

半夏五錢 廣木香一錢 龍中黃土六錢 蘇解三錢 全歸一錢 雲茯苓皮三錢
炒白芍三錢 黃芩炭二錢 炒茅蒼朮三錢 厚朴一錢 廣皮一錢 水五杯
煮取二杯渣再煮一杯分三次服

初二月 舌降甚胸中嘈雜無奈喉且痛糞中猶帶血跡議酸苦泄熱法

肉桂去粗皮黃芩二錢 生大黃片二錢 酒炒黑桃仁八分 厚朴一錢 龍中黃土八錢
枳殼六分 神麴五分 炒地榆炭一錢 檳榔八分 歸尾一錢 淨烏梅肉九枚
廣皮七分 廣木香八分 頭煎二杯二煎一杯分三次服服一帖去大黃肉桂再服一二帖

又 卽於去大黃肉桂方內再去歸尾地榆桃仁加蒼朮一錢五分

初二 四苓合苓芍法以小便短口糜猶有滯下也

焦白芍二錢 半夏三錢 龍中黃土三錢 炒黃芩一錢 蒼朮炭一錢 雲茯苓五分

皮三錢 猪苓三錢 當歸一錢 淨烏梅肉三錢 澤瀉三錢 山連一錢 頭煎兩杯分三次服

初三日 少腹脹痛不小便仍係肝鬱不主疏泄之故

降香三錢 小茴香三錢 炒黑歸身二錢 桃仁三錢 黃芩炭一錢 琥珀五分 生香

附三錢 兩頭尖三錢 口膈五厘 同研沖 雲連二錢 韭白汁二滴 煮三杯分三次服

服

初四日 於前方內加 廣鬱金二錢

初五日 苦辛淡法開下焦濕熱兼瀉肝火

荊芥五錢 川棟子三錢 吳萸炒黑一錢 生香附三錢 小茴香三錢 炒黑通草一錢

雲連三錢 黃柏炭二錢 水五杯煮取二杯分二次服

某小兒 滯下紅積欲便先痛便後痛減積滯太重非溫下不為功恐纏綿日久幼孩力不能勝滯下為臟病也

生大黃一錢五分 黃芩一錢五分 眞山連一錢 安邊桂一錢 紅耬一錢五分 檳榔一錢

焦白芍一錢五分 歸尾一錢 廣木香八分 煮兩杯先服一杯再便不痛卽止不

則再服一杯

丙戌六月十四日 孫四 感受燥氣燥金克木木有肝鬱故邪氣乘之現在胸痞微痛

先與開痞化鬱

旋覆花包三錢 香附二錢 杏仁泥三錢 降香末三錢 廣皮二錢 廣鬱金三錢

煮三杯分三次服外紫雪丹一錢分二次服

十六日 神昏煩躁邪入心包而又發黃勢甚重大勉與開心包一法與紫雪丹一

三錢以神清爲度湯藥清濕熱之黃

飛滑石六錢 猪苓三錢 麥冬不去心四錢 雪苔塊連皮五錢 澤瀉三錢 茵陳三錢 煮

三杯分三次服

十七日 伏暑成痢滯下紅積欲便先痛便後痛滅責之積重非溫下不可

生大黃酒炒成 川連 二錢 廣木香 一錢 安邊桂 三錢 黃芩 一錢 生白芍 三錢
降香末 三錢 紅麴 三錢 烏梅肉 三錢 廣皮炭 二錢 歸鬚 一錢 煮放三大
茶林每服半杯以便前之痛止爲度

日十八

昨與溫下服藥一杯而痛更甚下皆紅積邪入肝絡之故於前方內加

桃仁泥 三錢 檳榔剪 一錢 地榆炭 二錢 煎小半杯投入前藥分二次服

日十九

滯下紅積用溫下法服藥竟劑而痛畧減仍用前法稍減其製

生人黃 酒炒半錢 歸鬚 二錢 廣木香 二錢 安邊桂 二錢 去粗皮 紅麴 三錢 檳榔剪

一錢 生白芍 二錢 黃芩 一錢 炒廣皮 勿可太 二錢 小茴香 二錢 炒黑川連 一錢 烏梅

肉 二錢 煮三杯分三次服以痛止爲度

日二十

滯下痛減六七脈漸小擬仍服前方不必竟劑如痛止接服此方

生白芍 二錢 厚朴 三錢 小枳實 二錢 炒黃芩 二錢 檳榔 一錢 炒廣皮 二錢

杏仁泥 三錢 川連 一錢 白通草 三錢 廣木香 三錢 紅麴 三錢 烏梅肉 一錢

煮三杯分三次服

日廿一

陳積已去餘邪未淨右脈未靜日白晴仍黃故知氣分不清議進苦辛淡法宣導脈氣使餘邪由膀胱化氣而出兼與開胃令能納穀

雲苔皮

五錢

猪苓

三錢

廣木香

三錢

姜半夏

四錢

澤瀉

三錢

杏仁泥

二錢

炒白芍

三錢

厚朴

三錢

炒廣皮

二錢

炒黃芩

二錢

川連

姜汁炒半枳

一錢五分

煮三

杯分三次服

日廿二

邪著裏不易外達雖經下氣機究未宣暢肛門墜滯蓋由受邪之際漸而深故其化也亦緩而滯非苦無能勝濕非辛無能通利邪氣仍用前法重與行氣

炒銀花

二錢

澤瀉

三錢

炒黃芩

二錢

廣木香

三錢

茵陳

三錢

歸橫續

二錢

小枳實

三錢

赤芍

一錢五分

細甘草稍

二錢

檳榔煎

三錢

川連

一錢五分

烏梅肉

二錢

煮三杯分三次服

日廿三

夜半肛門痛甚陰分邪氣久羈今日漸覺畏寒陽明久不納穀胃氣不沖之故未可純任苦寒今擬暫用白頭翁湯法加溫藥仍是苦辛複法此權宜之計也

白頭翁 二錢 秦皮 二錢 廣木香 二錢 姜半夏 五錢 歸鬚 二錢 丹皮炭 一錢

川連 五分 廣橘皮 二錢 防風根 一錢 上肉桂 一錢 五分 煮三杯分三次服

日廿四

凡病日輕夜重者皆屬陰邪昨藥之偏於溫者以此今日肛門痛減者亦坐此茲邪去大半少寐不饑正須商進疏補脾胃勝濕仍不可少蓋胃和則神安矣脾治則痢減矣

焦白芍 三錢 於朮 二錢 白頭翁 整二錢 黃芩炭 一錢 肉桂 一錢 廣木香 三錢

姜半夏 五錢 山連 炒五錢 蒼朮炭 一錢 雲苔塊 四錢 廣皮 炒二錢 烏梅肉 一錢

高麗參 一錢 煮三杯分三次服

此方進而肛門愈熱痛積滯反多穢濁特甚者扶正則餘邪續出也

廿五日 昨得輕補肝之贅痛又甚正旺驅邪之故今日暫停扶正注意逐邪然久

病亦不敢太過舌白苔

炒白芍一錢五分 安桂二錢 小茴香炒炭二錢 炒黃芩一錢五分 歸鬚二錢 檳榔剪二錢
姜半夏五錢 秦皮二錢 南查炭二錢 白頭翁整三錢 紅麴二錢 炒山連一錢

煮三杯分三四次緩緩服

廿六日 昨與逐邪濁膩續下痛減今議再加疏補以扶正氣

白頭翁整三錢 肉桂去皮一錢五分 炒於朮二錢 炒白芍二錢 黃芩炒一錢五分 小茴香
炒三姜半夏五錢 歸鬚一錢五分 南查炭二錢 雲苓塊五錢 秦皮二錢 檳榔剪
八分 高麗參一錢 紅麴二錢 炒山連一錢 煮三杯分三次服

廿七日 積滯漸輕微有寒熱舌起白苔

雲苓塊連皮三錢 白芍炒一錢 廣木香一錢 姜半夏三錢 黃芩炭八分 焦神麴一錢
五焦於朮二錢 廣皮二錢 南查炭八分 高麗參一錢 煮三杯分三次服

廿八日 寒熱止積滯尙未盡舌苔白濁而厚是其徵也少寐少食皆其故於前方

增其製加宣通中焦

雲苓塊 四錢 白芍 錢炒一錢 廣木香 三錢 姜半夏 五錢 黃芩 炒一錢 焦神麴 三錢

益智仁 一錢 於朮 焦二錢 白薏仁 一錢 高麗參 一錢 廣皮 炒三錢 南查炭 二錢

錢 煮三杯分三次服

七月初一日 今日夜間尙有宿積舌微黃則其伏邪未盡可知猶非純補純清之症

雲苓塊 四錢 炒白芍 二錢 焦於朮 一錢 姜半夏 三錢 炒黃芩 一錢 焦神麴 三錢

益智仁 一錢 生薏仁 三錢 白薏仁 一錢 高麗參 一錢 炒廣皮 二錢

煮三杯分三次服

初四日 宿積猶然未淨舌白苔

雲苓塊 五錢 生苡仁 五錢 於朮炭 三錢 姜半夏 四錢 神麴 三錢 白薏仁 一錢

益智仁 一錢 廣皮 炒三錢 煮三杯分三次服

初八日 今日仍下宿積許多舌根黑苔未淨肛門熱痛不寐暫與清積一二日後

再議補法

雲苓塊 五錢 白頭翁 二錢 焦神麴 三錢 焦白芍 三錢 姜半夏 三錢 研益智
仁 二錢 黃芩炭 二錢 焦於朮 三錢 炒廣皮 三錢 煮三杯分三次服

十一日 痢雖止而不寐不饑仍然固係胃不和之故但其人平素好用心機又屆

心事叢雜之際未免過慮議一面和胃一面兼補心氣

雲苓 五錢 野山參 二錢 棗仁 炒熟 麥冬 不去心 焦於朮 二錢 蓮子 連皮心 打三錢

遠志 去淨丹 姜半夏 二錢 冰糖 三錢 煮三杯分三次服

丁亥九月初九日 史紅白滯下一月有餘痢疾之脈忌洪大喜腹脹此症腹不脹而脈

洪大所以難已日久便滑而頻數清滯之中兼與固下

黃芩炭 三錢 白芍 三錢 真山連 一錢 焦於朮 二錢 歸鬚 一錢 南查炭 一錢

廣木香 三錢 木瓜 二錢 五味子 一錢 肉果霜 一錢 紅麴 一錢 烏梅肉 二錢

丹皮炭 三錢 煮三杯分三次服

十五日 滯下已久六脈洪大有陽無陰前與重收陰氣而去積滯卽在收陰之中

以故脈見小而滯下少現在兩關獨浮有木陷入土之象切忌惱怒助肝克脾傷胃又忌生冷猪肉滑大便而助濕邪今日用藥大意仍不能驟離前法加入土中拔木兼補宗氣

高麗參 三錢 白芍 黃酒炒 五錢 廣木香 三錢 雲苓塊 三錢 黃芩 黃酒炒 三錢 南查炭

二錢 焦於朮 三錢 歸鬚 二錢 五味子 一錢 肉果霜 三錢 紅麴 二錢 烏梅肉

三錢 濃煎三茶杯分三次服

丁亥十月 初八日 德氏 七十歲 七旬以外之老人滯下紅白積業已一月有餘六脈洪大

滑數而且歇止乃痢疾之大忌舌苔老黃積滯未清腹痛當臍醫者一味收補置積滯於不問邪無出路焉得收功勢已重大之極勉與化滯兼與

溫通下焦

姜半夏 五錢 白芍 錢炒三 焦神麴 三錢 杏仁泥 三錢 黃芩 錢炒二 真山連 五錢

廣木香 三錢 檳榔 二錢 廣皮炭 三錢 川椒炭 三錢 歸鬚 二錢 烏梅肉 三錢

公丁香 一錢 紅麴 二錢 煮四小茶杯日三夜一分四次服

初十 滯下本係積滯暑濕之實症前醫一味呆補希圖止瀉不知邪無出路如

何能止腹痛已減議且減其製

姜半夏 三錢 白芍 錢炒一 檳榔剪 一錢 蒼朮炭 一錢 黃芩 錢炒一 廣皮炭

二錢 廣木香 一錢 山連 錢炒一 烏梅肉 二錢 川椒炭 一錢 紅麴 一錢 煮三杯

分早中晚三次服

戊子二月 初七日 陳 休息痢本係不治之症為其久久累贅氣血虛盡矣此症且喜

年輕形壯而又欲便先痛便後痛減陳積不行尚可借手於一下所謂網

開一面也金匱謂凡病至其年月日時復發者當下之

生大黃 五錢 酒炒半黑 歸鬚 三錢 降香末 三錢 上安桂 二錢 檳榔 二錢 廣木香

一錢 炒白芍 三錢 眞山連 二錢 炒黃芩 三錢 廣皮 三錢 烏梅肉 五錢 紅麴 五錢 煮三杯分六次服

初八 腹仍痛照前方再服一帖

初九 再服一帖

初十 血分久痢三用溫下陳積尙多皆起於誤補留邪在絡之故未便再用大

下恐致傷陰暫用通陰絡法細搜絡中閉錮之陳積三日後再服

化癥回生丹 十九早中晚各服一丸溫開水和

十七 餘邪留肝絡中一時難盡切戒厚味以固之藥宜搜剔法

降香末 三錢 黃岑炭 二錢 川椒炭 三錢 南查炭 二錢 焦白芍 三錢 廣木香 二錢

眞山連 八分 歸鬚 二錢 廣皮炭 三錢 丹皮炭 二錢 紅麴 三錢 烏梅肉 三錢

煮兩大杯分二次 晚一杯清晨空心服丸藥一丸

十八 復診於前方內去廣皮加白芍 二錢 烏梅 二錢 丸藥照常服

十九日 久痢邪留肝絡綿綿不已合苦辛搜絡無他謬巧仍宗前法

白頭翁 三錢 大黃 三錢 酒炒黑川椒炭 三錢 焦白芍 三錢 肉桂 頂好一錢 廣木 錢五分

香 三錢 黃芩炭 二錢 歸鬚 三錢 南查炭 二錢 降香末 三錢 山連 一錢 烏 一錢

梅肉 五錢 煮三杯分三次服 丸藥仍照前服

壬辰九月十一日 長四腸癖身熱古所大忌茲幼孩滯下紅白而身又熱症非淺鮮

炒白芍 二錢 桃仁 一錢 廣木香 八分 炒黃芩 一錢 歸鬚 一錢 炒山連 一錢

降香末 一錢 紅麴 一錢 炒神麴 二錢 南查炭 一錢 煮三杯分三次服

十三日 又加斑疹

炒白芍 二錢 連翹 二錢 眞山連 一錢 炒黃芩 一錢 銀花 二錢 廣木香 八分

檳榔剪 二錢 殭蠶 二錢 炒神麴 二錢 桃仁泥 一錢 蟬退 一錢 烏梅肉 二錢

歸橫鬚 一錢 紅麴 二錢 煮三杯分三次服

十五日 腸癖身熱本所大忌又加溫疹難就一邊現在斑疹已過四日業有漸化

之機但身壯熱如火譫語煩躁起卧不安滯下紅積後重太甚欲便先痛便後痛減責之積重不得不借手於一下所以網開一面也

黃芩一錢五分生大黃二錢五分黑紅麴一錢白芍一錢安邊桂一錢歸地一錢

檳榔一錢五分廣木香一錢廣皮一錢川連八分烏梅肉一錢煮三小茶杯分

三次服 外紫雪丹一錢五分每服五分溫開水調

十七日 滯下紅積狂熱譫語後重欲便先痛前日與溫下法茲大熱與譫語均退

惟後重未除滯下未清腰痠特甚雖仍腹痛且暫停下藥俟二日後細察病情再商

炒黃芩二錢桂枝一錢廣木香一錢炒白芍二錢神曲炒二錢廣皮炭一錢

檳榔剪二錢川連錢一烏梅肉三錢川椒炭一錢紅麴二錢煮三杯分三

次服

十九日 熱雖退而未盡舌色尚絳日乾滯下白積腰痠甚

炒黃芩二錢 檳榔一錢五分 小茴香三錢 炒白芍二錢 厚朴一錢 焦神麴三錢

茯苓塊三錢 銀花二錢 炒川連一錢 廣木香一錢 煮三杯分三次服

日廿一 諸症皆減滯下未清舌絳甚口渴仍後重脈仍數

雲苓一錢 三錢 銀花三錢 細生地三錢 炒黃芩二錢 歸鬚二錢 檳榔二錢 丹皮炭二錢 炒白芍二錢 川連分 烏梅肉三錢 煮三杯分三次服

日廿三 滯下白積未清便前仍痛微有身熱再少與溫下法

大黃酒炒半錢 熟附子一錢 神麴二錢 黃芩二錢 雲苓塊三錢 川連一錢 白芍二錢 烏梅肉三錢 廣皮二錢 煮三杯先服一二杯痛除則止

日廿五 去附子大黃又服一帖

日廿六 腹痛於原方內仍加附子大黃又加南查炭一錢 小枳實一錢 川椒炭一錢

分五再服二帖

日廿八 照原方再服二帖

三十日 滯下雖已大減仍有潮熱腹痛積滯仍未清也

炒白芍 三錢 南查炭 二錢 炒神麴 三錢 黃芩炭 二錢 廣木香 一錢 橘皮炭 一錢 雲苓皮 三錢 川椒炭 一錢 烏梅肉 三錢 生苡仁 三錢 煮三杯分三次服

積聚

甲子二月十三日 張七歲 臍右有積氣以故右脈沈伏弦細陽微之極濁陰太盛克之

也溯其初原從左脇注痛而起其爲肝着之咳無疑此症不必治咳但宜通肝之陰絡久病在絡故也使濁陰得有出路病可自已所謂治病必求其本者是也若不識綱領而妄冀速愈必致剝削陽氣殆盡而亡

旋覆花 新絳紗包三錢 烏藥 三錢 川棟子 二錢 桂枝尖 三錢 青皮 一錢 小茴香 三錢 降香末 三錢 歸鬚 三錢 蘇子霜 三錢 桃仁泥 三錢 廣皮 一錢 煮三杯分

三次服

十九日服通絡藥已見小效脈氣大爲回轉但右脇着席則咳甚脇下有支飲故

也議於前方內去桃仁川陳子小茴香加生香附三錢半夏六錢杏仁三

錢肉桂八分再服四帖

廿三日先痛後便而見血議通陰絡法

降香末三錢半夏五錢歸橫鬚二錢小茴香三錢香附二錢蘇子霜三錢

藏紅花一錢桃仁二錢廣皮炭一錢廣木香一錢丹皮三錢兩頭尖三錢

煮三杯分三次服

張二十歲左癥瘕面黃肢倦食少不能作文看書亦不能久宛如虛損與化癥

回生丹緩通陰絡法每日空心服一丸亦有早晚各服一丸之時服至二

年有餘計服化癥回生丹六七百丸之多癥始化淨氣體復原看書作文

始舉進士

吳一歲臍右結癥逕廣五寸羣丸如鵝卵太以受重涼又加暴怒而得痛不可

積聚

至

忍不能立不能坐竝不能卧服辛香流氣飲三日服五帖重加附子肉桂至五七錢之多絲毫無效因服天台烏藥散初服二錢滿腹熱如火燒明知藥至臍右患處如搏物者然痛加十倍少時腹中起痞積無數九一痞積下濁氣一次如是者二三十次腹中痛楚鬆快少時痛又大作服藥如前腹中熱痛起痞積下濁氣亦如前但少輕耳自己初服藥起至亥正共服五次每次輕一等次早腹微痛再服烏藥散則腹中不知熱矣以後每日服二三次七日後腫痛全消後以習射助陽而體壯

乙酉四月廿六日

葉四十無論癰疽雖有氣血之分然皆係陰病結於陰部豈有用陰

藥之理維日已久沈寒痼冷之疾非巴豆不能除根 天台烏藥散

六月初九日

業已見效未能除根照常服前藥早晚各五分癰痛發時服二錢舌苔

白厚面色淡黃而暗左脈沈細陽微再與湯藥行濕通服

雲苓塊 五錢 半夏 五錢 益智仁 一錢 生苡仁 五錢 茯苓 二錢 白薤仁 一錢 連皮

川萆薢四錢 廣皮三錢 白通草一錢 煮三杯分三次服服至舌苔退爲度

乙酉五月廿九歲 十年癡氣六脈弦細而緊

烏藥三錢 小茴香炒黑五錢 吳萸泡淡三錢 良姜二錢 川椒炭五錢 歸鬚二錢 煮三

杯分三次服

初九病減者減其製每日服半帖

乙酉五月廿一日 王氏歲四十六 脈弦緊心下伏梁非易化之症一生憂泣肝之鬱也可

知又當燥金太乙天符之年金來克木痛愈甚矣與溫絡法其吐血亦絡

中寒也

降香末三錢 半夏三錢 小枳實三錢 川椒炭一錢 廣皮一錢 歸橫鬚三錢

公丁香八分 煮三杯分三次服四帖

廿五諸症皆效自覺氣上阻咽加旋覆花包五錢

廿九效不更方再服

六月初六日 加淡吳茱萸三錢

乙酉五月廿四日 金氏三十歲 瘕結脘左經來必痛六脈沈細陽微

川棟子 三錢 全歸 三錢 淡吳茱 三錢 降香末 三錢 良姜 二錢 公丁香 一錢

小茴香 三錢 艾炭 三錢 煮三杯分三次服服七帖後接服化瘕回生丹

六月初二日 業已見效每日服半帖再服十天

二十日 每行經前三日腹微痛時空心服 化瘕回生丹 一丸服至經盡後腹中

絲毫不痛爲止下月經行痛發時再如此服法瘕瘕痛亦空心服一丸化淨爲度

丙辰

五月五日 車五錢 鬢髮已白大半臍左堅大如盤隱隱微痛不大便數十日先

延外科治之外科謂腸癰以大承氣下之三四次終不通延余診視按之堅冷如石面色青黃脈短澀而遲先尚能食屢下之後糜粥不進不大便已四十九日余曰此瘕也金氣之所結也以肝木抑鬱又感秋金燥氣小

邪中裏久而結成愈久愈堅非下不可然寒下非其治也以天台烏藥散二錢加巴豆霜一分姜湯和服設三服以待之如不通第二次加巴豆霜一分五厘再不通第三次加巴豆霜二分服至三次後始下黑亮球四十枚堅莫能破繼以苦溫甘辛之法調理漸次能食又十五日不大便余如前法下至第二次而通下黑球十五枚雖亦堅結然破之能碎但燥極耳外以香油熬川椒製其堅處內服苦溫芳香透絡月餘化盡於此症方知燥金之氣傷人如此而溫下寒下之法斷不容紊也

乙丑年

治通延尉久疝不愈時年六十八歲先是通延尉外任時每發疝醫者必用人參故留邪在絡久不得愈至乙丑季夏受涼復發堅結肛門坐臥不得脹痛不可忍汗如雨下七日不大便余曰疝本寒邪凡堅結牢固皆屬金象況現在勢甚危急非溫下不可於是用天台烏藥散一錢加巴豆霜分許下至三次始通通後痛漸定調以倭硫黃丸兼用金匱蜘蛛散漸次

化淨

淋濁大小便閉

即六十歲便濁帶血既有膀胱之濕又有小腸之熱用導赤合四苓湯

滑石飛五錢 茯苓皮五錢 蒼朮三錢 梔子五錢 次生地五錢 澤瀉三錢 木通

三錢 甘草稍一錢 竹葉二錢 煮三杯分三次服

又少腹痛於前方加川楝子三錢 小茴香三錢

王十七歲濕土司天濕熱下注致成淋症莖腫

茯苓皮五錢 萹蓄五錢 車前子二錢 生苡仁五錢 澤瀉三錢 甘草稍二錢

飛滑石二錢 虛根三錢 白通草一錢 煮三杯分三次服

又於前方內加黃柏炭二錢

龔五十八歲先是大小便俱閉自用大黃八錢大便雖通而小便涓滴全無續用五
苦仍不通診其六脈弦緊病因肝鬱而成當開陰絡

降香末 三錢 歸續 三錢 琥珀 三錢 兩頭尖 三錢 丹皮 三錢 麝香 五厘 全研沖 韭

白汁 三錢 煮三杯分三次服一帖而通二帖而暢

管八歲小便淋濁莖管痛不可忍白用五苓八正葶藶分清飲等淡滲愈利愈

痛細詢病情由房事不遂而成余曰溺管與精管異途此症當通精管為

是用虎杖散 以現無虎杖草 杜牛膝 五錢 丹皮 三錢 歸橫 三錢 降香末 三錢 琥珀 六分 兩頭尖 三錢

桃仁泥 三錢 麝香 五厘 全研沖 煮三杯分三次服一帖而痛減五帖而痛止七

帖濁淨後以補奇經而愈

珍 歲 十八 血淋太多先與導赤不應繼以脈弦細詢由怒鬱而起轉方與活肝絡

新絳紗 三錢 歸續 三錢 片姜黃 二錢 旋覆花 三錢 香附 三錢 蘇子霜 二錢

降香末 三錢 鬱金 二錢 丹皮炭 三錢 桃仁泥 三錢 紅花 二錢 煮三杯分三

次服四帖而安

吳氏醫案

淋濁

五

王四十五歲小便狂血脈弦數病因怒轉

細生地 五錢 香附 三錢 降香末 三錢 新絳紗 三錢 歸鬚 三錢 桃仁泥 三錢

青皮 二錢 旋覆花 三錢 丹皮炭 五錢 煮三杯分三次服服四帖而血止止

後兩月又因動怒而發仍與前方七帖而愈

范七歲因怒鬱而大小便閉與極苦以通小腸借通膽腑法

蘆薈 三錢 龍胆草 三錢 鬱金 三錢 胡連 三錢 桃仁泥 三錢 歸鬚 三錢 煮三

杯分三次服服二帖而大小便皆通

保女八歲怒鬱少腹脹大如斗小便涓滴全無已三日矣急不可忍仰臥不能轉

側起立腹開陰絡

降香末 三錢 香附 三錢 廣鬱金 二錢 龍胆草 三錢 琥珀 五分 兩頭尖 三錢

歸橫鬚 三錢 韭白汁 三錢 麝香 五錢 沖 小青皮 五錢 煮三杯分三次服一

帖而通二帖而暢

保五 夏日痘後受暑小便不通脈洪數玉莖腫亮捲曲如鉤與涼利膀胱法

飛滑石 六錢 雲苔皮 五錢 杏仁 三錢 苡仁 五錢 白通草 一錢 犀沙 三錢 煮

三杯分三次服一帖而通三帖而玉莖復元

乙酉七月 王 八歲 金貨無聲六脈俱弦痰飲而兼濕痺小便白濁先與行濕

姜半夏 五錢 滑石 六錢 杏仁泥 四錢 雲苔皮 五錢 桂枝 三錢 晚蠶沙 三錢

川莽前 五錢 防已 三錢 白通草 一錢 生苡仁 五錢 甘草 一錢 煮三杯分三

次服

十四 復診於原方加 猪苓 三錢 澤瀉 三錢

九月初 伏飲濕痺便濁前與淡滲通陽已服過三十三帖因停藥二十餘日現

在飲又上泛胸滿短氣腰痠淋濁未除且與行心下之飲脈弦細陽不復

雲苔皮 五錢 桂枝 四錢 晚蠶沙 三錢 姜半夏 五錢 杏仁 四錢 廣橘皮 五錢 川

芎藭 五錢 防已 四錢 白通草 一錢 小枳實 四錢 煮三杯分三次服

十二日 於前方去杏仁防已加姜半夏 五錢 生苡仁 五錢

五月初五日 痰飲痺症淋濁皆寒濕為病誤與補陰以致濕邪膠痼沈着急難清楚

前與開痺和胃現雖見效不少究係濕為陰柔之邪久為呆補所困難以旦晚奏功也

飛滑石 六錢 桂枝 四錢 生苡仁 五錢 姜半夏 六錢 猪苓 三錢 小枳實 三錢

雲苓皮 五錢 澤瀉 三錢 晚蠶沙 三錢 川萆薢 五錢 廣皮 五錢 車前子 三錢

煮三杯分三次服

廿五日 濁濕誤補久留與開太陽闔陽明法數十帖之多雖大見效究未清楚小

便仍間有濁時腿仍微有痠痛

姜半夏 一兩 桂枝 四錢 川椒炭 三錢 雲苓皮 五錢 猪苓 三錢 片姜黃 二錢

生苡仁 五錢 防已 三錢 晚蠶沙 二錢 川萆薢 五錢 廣皮 五錢 白通草 一錢

小枳實 三錢 煮三杯分三次服

十一月癰症火痰飲小便濁喉啞先開上焦後行中下之濕餘有原案

苦桔梗 五錢 半夏 一兩 雲苓皮 五錢 生苡仁 五錢 杏仁 五錢 生甘草 三錢

煮三杯分三次服 喉啞服此

備用方 行中下兩焦濁濕法

煎滑石 一兩 杜枝 四錢 生苡仁 五錢 雲苓皮 六錢 黃柏 三錢 益水炒 車前子 四錢

姜半夏 六錢 廣皮 三錢 晚蠶沙 三錢 川萆薢 五錢 煮三杯分三次服 便

濁服此

戊子二月 桑 先淋後且血簍後癰而脹痛脈洪數應從精道論治與虎杖散

合導赤法

杜牛膝 三錢 白芍 三錢 木通 二錢 細生地 三錢 丹皮 五錢 琥珀 三分 降香

末二錢 歸鬚 二錢 兩頭尖 三錢 口腐 全研 沖 煮三杯分三次服

辛卯三月 滿六十歲血淋多年不愈起於驚閃現在痛甚有妨於溺溺則痛更甚

且有紫血條顯係瘀血之故法當宣絡再久病在絡又定痛亦須絡藥蓋定痛之藥無不走絡走絡之藥無不定痛但有大絡別絡腑絡臟絡之分此症治在陰絡左脈沈弦而細所謂沈弦內痛是也

杜牛膝 三錢 桃仁 三錢 歸橫 三錢 降香末 三錢 琥珀 全研細 兩頭尖 三錢

錢 丹皮炭 五錢 口腐 全研細 煮成三小茶杯分三次食遠服

照前方服一帖

於前方內加小茴香炭 五錢 杜牛膝 加二錢 琥珀 加二分 口腐 加二厘再

服二帖

血淋之後音淋顯有穢濁之物下出不暢以故效而未愈再用前法而進之大抵以濁攻濁

杜牛膝 五錢 歸橫 三錢 兩頭尖 三錢 小茴香 五錢 琥珀 八分 川椒炭 二錢

降香末 三錢 韭白汁 每杯點口腐 全研細 丹皮炭 三錢 煮三杯分三次服

廿六 病減者減其製照原方服半帖

廿七 脈數身熱風溫所致如今晚仍然大熱明日服此方溫病宜辛涼最忌發

表且有下焦病以純走上焦勿犯中下二焦爲要

連翹三錢 苦桔梗三錢 甘草二錢 銀花三錢 香豆豉三錢 蘆根三錢 薄荷

八分 荊芥穗一錢 煮小杯杯分三次服

廿八 照原方再服一帖

廿九 風溫解後服溫藥治他病太急微有喉痛之意且與清上焦開提肺氣無

任溫病餘邪滋長其下焦溫藥初一日晚再服未遲

桔梗三錢 殭蠶二錢 甘草一錢 連翹三錢 蟬退去頭足一錢 蘆根三錢 銀花一

錢 煮二杯分二次服

三十 照前方服一帖

四月初一日 以病退八九故未服藥

初二日 風溫已解無餘膏淋亦清至九分惟溺後微痛微有絲毫濁滯未清議用

前通絡泄濁法五分之一以清餘邪俟十分清楚再商善後

茯苓 連皮 三錢 杜牛膝 一錢 丹皮 二錢 琥珀 二分 小茴香 二錢 歸須 八分 兩頭

尖 一錢 口腐 全研細 煮一大茶杯分二次服以濁滯淨盡為度

初三日 照前方服一帖

初四日 大痛之後胃氣受傷食少而陽氣不振再九發不和皆屬胃病擬通補胃

陽莫開胃健食穀氣以生宗氣

雲苔塊 五錢 益智仁 二錢 麥冬 不去心 三錢 高麗參 二錢 橘皮炭 四錢 生薑 三

片 姜半夏 三錢 炙甘草 二錢 大棗 去核 煮三杯分三次服

初五日 仍服前方

初六日 前方仍再服

泄瀉

乙酉四月 四十
十五日 陶五歲 久泄脈弦自春而來古謂之木泄侮其所勝也

柴胡 三錢 雲苓塊 五錢 廣皮 三錢 桂枝 三錢 姜半夏 五錢 生薑 五錢 猪苓

三錢 炙甘草 二錢 大棗 三枚 澤瀉 三錢 煮三杯分三次服

十九日 泄瀉已減於前方內加炒蒼朮 三錢 前後共服十三帖全愈

五月初六日 前曾木泄與小柴胡湯十三帖而愈向有糞後便血乃小腸寒濕之症

現在脈雖弦而不動且兼緩象大便復清不必用柴胡法矣轉用黃土湯

法 去柔藥避其滑潤

竈心土 四兩 雲苓塊 連皮 五錢 熟附子 三錢 炒蒼朮 五錢 黃芩炭 二錢 廣皮炭

二錢 煮三碗分三次服

十一日 濕多成五泄先與行濕止泄其糞後便血少停再議

雲苓 連皮 六錢 生苡仁 五錢 桂枝 五錢 猪苓 五錢 茅蒼朮 四錢 廣皮 四錢 澤瀉

五錢 廣木香 二錢 煮三杯分三次服以泄止爲度

八月初六日 胃不開大便澹小便不暢脈弦

雲苓皮 五錢 柴胡 一錢 白蔻仁 一錢 生苡仁 五錢 猪苓 三錢 廣橘皮 一錢

姜半夏 三錢 澤瀉 三錢 煮三杯分三次服

乙酉五月十九日 陸氏二十六脈弦細面色淡黃泄則脾虛食少則胃虛中焦不能建

立安望行經議先與強土

雲苓塊 三錢 半夏 三錢 藿香梗 二錢 益智仁 一錢 苡仁 二錢 白蔻皮 一錢

廣木香 一錢 蘇梗 一錢 廣皮炭 一錢 煮三杯分三次服

廿八日 右脈寬泛緩也胃口稍開泄則加添小便不通加實脾利水

雲苓塊 五錢 猪苓 三錢 澤瀉 二錢 生苡仁 五錢 加在前方內

六月十八日 前方服十四帖泄止胃稍醒脛中悶舌苔滑周身痠痛六脈弦細而沈

先與和胃治痠在後

生苡仁 五錢 桂枝 三錢 益智仁 一錢 姜半夏 五錢 杏仁 二錢 藿香梗 二錢

白蔻仁一錢

防已三錢

廣橘皮二錢

煮三杯分三次服